

“麥迪森” 亞妥明眼藥水 0.01%

“AIM” Atropine Eye Drops 0.01%
(Atropine Sulfate)

不含防腐劑 • 不產生交互感染

【說明】

本品是一種無菌使用於眼部之局部抗乙酰膽鹼作用劑。

【成份】

每 mL 含 Atropine Sulfate.....0.1mg

賦形劑： HPMC-606、 Sodium Chloride、 Boric Acid、 Sodium Borate、
Hydrochloric Acid、 Distilled Water

【適應症】

散瞳及睫狀肌麻痺。

【用法用量】

通常一次 1-2 滴，一天 1-4 次，視症狀酌於增減。限由醫師處方使用。

【禁忌】

1. 有青光眼或有導致狹角性青光眼傾向之患者禁止使用本品。
2. 曾因本藥成分引起過敏的人請勿使用本藥。

【警告】

1. 過量使用於小孩和對特定成分過敏者，可能會產生全身中毒症狀，應停止使用並以適當藥物治療，參見【過量】段落。
2. 使用後會產生視力模糊，應避免駕駛汽機車。

【注意事項】

1. 本藥為可回蓋式(re-cap)不含防腐劑拋棄式小包裝眼藥水，需於 24 小時內使用完畢。
2. 使用前，請洗淨雙手。
3. 請依照醫師指示使用。

【副作用】

使用時，可能會產生畏光及近距離調節作用不足之現象。曾有發生眼瞼過敏反應、局部刺激、充血、腫大、結膜濾泡增殖炎或皮膚炎的報告。

【過量時】

全身性 atropine 中毒症狀，包括臉部潮紅、皮膚乾燥(小孩可能會出現紅疹)、視力模糊、心跳加快與心跳不規律、發燒、腹脹、便秘、譫妄、神經肌肉不協調、年紀大者會精神恍惚、長期散瞳。如有過量現象，應使用水或 0.9%生理食鹽水沖洗，如意外攝取(吞食)時，可使之嘔吐或洗胃，必要時需全身支持措施和靜脈注射毒扁豆鹼(physostigmine)治療。

【懷孕婦女】

Atropine sulfate 尚未有動物生殖研究，目前尚未清楚局部 atropine sulfate 是否會對胎兒造成傷害或影響生殖能力。僅當清楚需要時，本品可應用於孕婦。

【幼兒】

請參見禁忌和警告段落

【儲存】

請儲存於 25°C 以下，避免陽光及日光燈直射。

需置於小孩接觸不到之處。

【包裝】

0.5 mL LDPE 瓶裝。

衛部藥製字第 059755 號



麥迪森醫藥股份有限公司

公 司：臺北市中正區林森南路10號5樓

桃園廠：桃園市桃園區桃鶯路445-2號1樓