

“黃氏”

倍康納鼻用噴液

Beclo[mase Aqueous Nasal Spray “H.S.”

【成分】 Each ml contains

Beclo[methasone Dipropionate.....1.11mg

【作用】

本品主成分係一種選擇性抗炎類固醇，其作用乃基於局部性抗炎作用，噴於鼻黏膜上被吸收可有效控制鼻炎，在正常劑量使用下，並無全身性之副作用。本品為一種懸浮劑，可替代一般鼻噴霧劑，可使病患免受鼻腔乾燥感。

【適應症】

季節性過敏性鼻炎、常年性過敏性鼻炎。

【用法用量】 本藥須由醫師處方使用

成人：每鼻孔每天一次噴入量，每次噴兩次量（即200 μ g/2dose）或每天兩次每次噴一次量（即100 μ g/dose）。每天最高劑量為30次噴入量。小孩：按年齡或病況嚴重性，達鼻孔每次噴一次量（即100 μ g/dose），每天一次至兩次。未滿12歲之孩童，每天之最高劑量為五次噴入量（即500 μ g/天）。

【禁忌症】

1. 無特殊禁忌者，然而肺結核患者應謹慎使用。
2. 妊娠前三個月之孕婦。
3. 對本品產生過敏性之患者。

【副作用】

鼻腔刺激感、噴嚏、罕見鼻出血、鼻咽念珠菌感染。

【注意事項】

1. 本品務須按醫師之指示常規使用才能期望理想之療效。

2. 本品之療效並非立即性的，使用本品要在幾天後才會顯出完全的療效。

3. 對於那些正在使用全身性類固醇藥物之病患，若欲改用本品，前述藥物仍須為一週內逐次減量與本品使用，以防止住其他過敏性能疾病之產生。

【包裝】

100 毫克以下塑膠瓶裝；25℃ 以下室溫儲存。

【使用說明】




第一步：使用前請先將本品充分

搖勻，取下保護蓋，輕擱鼻子，將鼻孔弄乾淨。


第二步：使用之操作是以拇指壓

住瓶底，以食指和中指夾住瓶頸之環座，然後用指力壓下將來內懸液噴出。



第三步：如圖將本品之噴口

放入鼻孔中，以食指壓住另一鼻孔，按圖二所示之操作法用指力緩壓噴出內懸液之同時，口部緩慢吸入，然後另一鼻孔照上述步驟使用之。



第四步：用畢後，清洗口，覆蓋保護蓋，並妥貯存。

製造廠：



® CIMP 藥廠

黃氏製藥股份有限公司

雲林縣斗南鎮大同路44巷11號

E-78