

“信東”必坦寧吸入液 2.5公絲／公撮

Butanyl Inhalation Solution 2.5^{mg}/_{ml}

(Terbutaline Sulfate) “S.T.”

【特 性】

Terbutaline是一種選擇性腎上腺β₂感受體刺激劑，作用時針對支氣管肌肉，β₂刺激劑能舒緩支氣管平滑肌，改進膿性粘液之運送，同時亦可改進粘膜纖毛的異物清除及同系肌肉的緩解。

用Terbutaline治療後，Terbutaline可經由血液深入身體週邊組織，其由體內排除之半衰期約為15小時，惟其投與間隔仍應斟酌縮短，以維持Terbutaline代謝末期之血中濃度在治療範圍內。

Terbutaline可用於有或無輔助呼吸的噴霧器，對於急性或亞急性發作的病患，可彌補傳統式吸入器不理想之處，且適用於嚴重氣管阻塞的維護醫療。

Terbutaline使用方便，無須稀釋具等張性，不含防腐劑。

【成 分】

Each ml contains:

Terbutaline Sulfate.....2.5mg

【適應症】

支氣管氣喘、支氣管炎及肺氣腫所伴隨之支氣管痙攣之緩解。

【用法與用量】

本藥須由醫師處方使用。

取一單一劑量，旋轉上端瓶口，即可開封，然後將該製劑擠入噴霧器的貯存槽，可維持24小時穩定備用。

單一劑量開封後逾三個月，不得繼續使用。

每一單一劑量5mg／2ml，一日使用四次，若一次單一劑量未用畢，可存於噴霧器之貯存槽，24小時內仍安定可使用。

【注意事項】

對擬交感神經胺類敏感的病患，須小心使用。

例如：患甲狀腺機能亢進缺乏適當的控制者。

由於血中葡萄糖會增進β₂刺激劑的效用，所以糖尿病患者，於開始使用Terbutaline時，須注意血糖的控制。

β₂刺激劑已成功地用於治療缺血性心衰竭，但此類藥物亦可能引起不整脈，因此，治療肺疾病患時，須依病情作個別考慮。

● 孕婦及妊娠投與

跨胎尚未見於動物及病患，但妊娠三個月以內的婦女，仍須小心投與。Terbutaline經使用多年，適用於孕婦及產婦，無不良影響之

報告，亦不干擾生殖過程。

Terbutaline雖流注母乳，但醫療劑量對嬰兒無不良影響。

● 副作用

依推薦藥量使用，罕有副作用出現，Terbutaline 採吸入治療不致發生嚴重的全身副作用，因進入全身循環之藥物濃度，未達產生全身性作用之量。可能發生之副作用如振顫、痙攣、心悸等，全是擬交感神經興奮性胺類藥物典型的副作用。一旦發生，通常1~2週內治療後，自然恢復。

● 使用上注意

須巡視病人的吸入技巧，每個噴霧器亦應調配以最佳劑量，一旦療效減退，病患須自動與醫師諮詢。

非選擇性的β阻斷劑可能部份甚至完全抑制β₂-刺激劑的作用。

本製劑非注射用，只適用於呼吸器或噴霧器。


【性 狀】

化學名：α - [(tert - Butylamino)methyl] - 3,5-dihydroxybenzyl alcohol Sulfate

分子式：(C₁₂H₁₉NO₃)₂·H₂SO₄

分子量：548.65

化學構造式：



【貯 存】

貯存於15~30℃處所，避光、避免冰凍。

【包 裝】

2ml單一劑量塑膠瓶裝，100支以下盒裝。

衛署藥製字第043735號 G-7078



信東生技股份有限公司

桃園市介壽路22號

IB 014③