

阿腸克浣腸劑20公絲/公撮

COLASA ENEMA 20 MG/ML

衛署藥製字第045696號
(G-8022)

【性 狀】

Mesalazine 製劑

浣腸劑：淡粉紅棕色黏液，每瓶100毫升中含2公克之Mesalazine

【適應症】

潰瘍性結腸炎、輕度到中度直腸炎及直腸乙狀結腸炎。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

成人：於夜間一次使用2-4 GM (1-2 瓶)，兒童：劑量未定

【禁忌症及注意事項】

【禁忌症】

- (1)對Salicylates製劑過敏患者。
- (2)嚴重腎損傷患者(GFR 值小於 20 毫升/分)。
- (3)2歲以下兒童

【注意事項】

腎疾患者：

Mesalazine在體內主要以其代謝物N-Acetyl 5-Amino Salicylic Acid經由腎臟快速排泄。曾用老鼠以高劑量Mesalazine靜脈點滴注射，會引起腎小管及腎絲球體之毒性。雖然目前為止，未曾有任何腎毒性發生，但腎損壞患者應避免使用。血中尿素過高及蛋白尿患者應小心使用。

孕婦：

本品並不會發生類似Sulphasalazine之代謝物 Sulphapyridine之核黃膽症(Kernicterus)。目前為止尚無任何文獻指出Mesalazine有致畸胎之危險性。

在應用Sulphasalazine治療中會有極微量之Mesalazine會穿透過胎盤，但乳汁分泌中並未發現。懷孕期間限於醫師指示治療之需要大於可能發生之危險時謹慎使用。

老年人：

限腎機能健全之老年人，但仍應小心使用。

【副作用】

少部份患者會有副作用之發生，但這些患者先前對Sulphasalazine亦有耐受性不佳之現象。本品之副作用主要為腸胃症狀如：噁心、腹瀉、腹痛、頭痛。

阿腸克可能伴隨結腸炎之症狀惡化，但這些患者在應用Sulphasalazine治療時亦曾有相同之困擾。至於Sulphasalazine會引起之其他副作用，如：抑制骨髓、精子數目和生育功能之抑制作用，在Mesalazine則未曾有任何發現。

【過量之治療】

洗胃；靜脈輸注電解質以促進排尿，本品無特殊之拮抗劑。

【其 他】

Sulphasalazine的兩個主要組成分為Sulphapyridine及 Mesalazine。

Sulphasalazine之副作用主要與Sulphapyridine有關，而 Mesalazine實際上為Sulphasalazine用於治療潰瘍性結腸炎之有效成分。COLASA只含此有效成分，並且局部作用於結腸。

【貯 藏】 貯存於25 C以下乾燥處，避免陽光直接照射。

【包 裝】 浣腸劑：100 ml 塑膠瓶裝。

【委託製造者】 科進製藥科技股份有限公司

【地 址】 臺北市南港區園街3號14樓之1，D室


【電 話】 02-26557568

【製 造 廠】 聯亞生技開發股份有限公司新竹二廠

【廠 址】 新竹縣湖口鄉光復北路45號

患者使用須知：

1. 使用前，先把浣腸劑置於溫水中約10分鐘使其接近體溫之溫度。
2. 插入浣腸劑前，先將之振搖均勻。
3. 除非經醫師特別指示，否則浣腸劑需睡前給予。
4. 打開瓶蓋後，將所附插管插在瓶口上。
5. 請用少許凡士林塗抹在浣腸劑之插管上。
6. 請採用下列側臥姿勢投予本浣腸劑：



左側側臥，左腳伸直，右腳彎曲。

7. 輕輕地將浣腸劑的插管塞入肛門，並推進至瓶蓋口為止。
8. 將藥液慢慢地完全擠進肛門內(至少1分鐘)。
9. 確定藥液完全灌入後，將藥瓶保持完全擠壓之現狀下拔出，並連瓶丟棄之。
10. 為確保浣腸劑能滯留體內，病人應維持相同姿勢5~10分鐘。然後可以平常姿勢睡覺，盡量不去大便直到第二天早上。

注意事項：

為避免藥品懸浮液因乾涸而於瓶蓋上呈現棕褐色之結塊，

建議：

存放時儘量瓶口朝上直立，可避免結塊形成。

開蓋時若有棕色結塊掉落，可取出並搖勻後再使用。

瓶口微量結塊屬正常現象不影響產品品質，請放心使用。