

力克 眼用軟膏

Devirus Ophthalmic Ointment

【作用】

Acyclovir是一種抗病毒藥物，在體外試驗中，對單純性疱疹（HSV）第一、二型與水痘帶狀疱疹病毒非常有效。

Acyclovir在進入被疱疹感染的細胞後，會磷酸化成活性化化合物。這第一步驟的反應須依賴病毒生成的thymidine kinase酵素。

Acyclovir三磷酸化合物會成為疱疹特異性DNA polymerase的抑制劑和受質，因此可以中止病毒DNA的合成，而不會干擾正常細胞的代謝作用。

眼藥膏中的acyclovir可經由角膜上皮及眼球表面組織很快地吸收，在眼前房水的濃度即可有效的抵抗病毒。本藥局部投與時，使用目前的方法無法偵測acyclovir在血液中的濃度，在尿液中的量可以偵測得出，但不具意義。

【成份】

Each gram contains :

Acyclovir.....30mg

【適應症】

單純疱疹性角膜炎。

【用法用量】

下列劑量適用於各種年紀的患者。

將軟膏擠出約1公分，塗於下結膜囊中，每天塗用5次，每次間隔約4小時，痊癒後，必須再繼續治療3天。

本藥須由醫師處方使用。

【禁忌症】

已知對acyclovir過敏者，不可使用。



【注意事項】

使用本藥後可能會產生短暫性之輕微刺痛。

致突變性：在體內及體外所做廣泛之基因突變試驗結果指出acyclovir對人類沒有遺傳基因改變之危險。

生育力：對老鼠和狗投與超過治療劑量的大量acyclovir時，在毒性反應中包括會對精子生成有可逆性的不良作用。

經由兩代的老鼠研究中，發現口服投與acyclovir對生育力沒有任何不良作用。

本藥對人類女性生育力的影響，尚無任何資料。

致癌性：對大鼠及小鼠的長期研究中，並沒發現acyclovir有致癌性。

【藥物交互作用】

Probenecid會使acyclovir的平均半衰期和血漿濃度曲線下的面積增加。其他影響腎生理功能的藥物，有可能會改變acyclovir的藥品動力學。但是，臨床經驗並沒有發現其藥物會與acyclovir發生交互反應。

【副作用】

少部分的病人使用本藥品會產生短暫之輕微刺痛。曾有報告指出，使用本藥後發生表面斑點狀角膜病變，但曾報導使用本藥後有局部刺激及發炎現象，如：臉炎及結膜炎。

【懷孕、授乳】

對兔子或老鼠的投藥試驗中，並沒有發現胚胎毒性或畸胎性。

但在人體使用的臨床經驗仍屬有限，因此只有在衡量過可能的效果會大於未知的危險性時，才可使用本藥。目前有限的數據顯示本藥會由乳汁分泌出來。

【過量】

有人誤食整條含有135mg acyclovir的軟膏，沒發現有不良反應。

口服每次800mg，一天5次（即每天4公克），連續5天，也沒有副作用報告。

甚至不小心靜脈注射80mg/kg的高劑量，並無不良反應發生，acyclovir可被透析。

【藥物注意事項】

經打開一個月後之本藥必須丟棄。

【包裝貯存】

100公克以下鋁管、塑膠管。本藥應貯存於25°C以下。

0901-01



溫士頓醫藥股份有限公司

台南縣永康市仁愛街117號