

凝沙凝膠[®]

Esarin[®] Gel

GMP - 10767

衛署藥製字第051522號

成 份：

Each gm contains:

Escin	10mg
Heparinoid	10mg
Diethylamine salicylate	50mg

作用方式：

凝沙凝膠是一種含酒精之製劑，它的三重作用是來自於它的三種成分：

Escin 以一種易於滲透入皮膚的形式(吸收性Escin)擊敗組織水腫，減低血管滲透性和預防組織內水的存積；局部性水腫引起的沉重和壓力感可以被去除。**Heparinoid** 有類似肝素的作用，能改善血液循環，抑制凝固作用，與 **Escin**合併有抗發炎作用，且同時激發連結組織的再生。水楊酸二乙胺(Diethylamine Salicylate)能增強抗發炎作用，且對去除深部疼痛有效。

適 應 症：

慢性靜脈功能不全之輔助改善及創傷後之疼痛緩解。

副作用：

可能產生皮膚過敏反應。

用法用量：

本藥須由醫師處方使用。

塗一薄層於皮膚受害部位，一天一次或多次，此藥不必按摩使滲入皮膚內，但如想這麼做的話也可以，當處理潰瘍時，僅適於塗擦在潰瘍周圍的皮膚上。

保存條件：

儲存於30°C以下，藥品應置於小孩不易取得處。在有效期間內使用。

包裝：

1000公克以下鋁管裝。

委託者：田上股份有限公司

地 址：高雄市小港區桂忠街35號

製造廠：中國化學製藥股份有限公司新豐工廠

地 址：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號