

"培力"益欣凝膠1.5%

Esecin Gel 1.5 % "P.L."

衛署藥製字第052416號

[作 用]：

Aescin由於具有活性素 β -Escin(其具有保護及振奮微血管微循環的性質)故有鎮痛及抗腫的作用。能使浮腫消失，促使毛細管膜恢復正常之滲透性，具有保護血管壁，特別是毛細血管膜，並增強其抗滲透力；具有抗炎的性能，能矯正組織發炎症狀。

[成分]：每公克凝膠含有：

Escin.....15mg

[適 應 症]：

改善慢性靜脈功能不全引起局部腫脹之輔助療法。

[用法用量]：

取出約一碗豆之量，直接塗在要治療的病變處。如果病變範圍需要使凝膠均勻，請輕輕按摩腫脹部位，也可以棉花棒塗抹。五天內一天平均塗抹五次，本藥須由醫師處方使用。

[禁 忌]：

由於薄荷腦的存在，三十個月以下的兒童請勿用。請放在小孩拿不到的地方。

[包 裝]：

1000公克以下塑膠瓶裝及塑膠軟管裝。

[儲 存]：請儲存於25℃以下，避免冰凍。



培力藥品工業股份有限公司

台中市工業區六路十一號

電 話：(04)23592576 (代表號)

傳 真：(04)23590992