

“溫士頓”

比達爽

眼用軟膏

"Winston"

Betason-N EYE OINTMENT

副腎皮質類固醇在眼睛疾病治療上之價值，素為醫學界所公認，本劑係含新合成之副腎皮質類固醇Betamethasone，於局部使用時其消炎力為Prednisolone之8-10倍且較Dexamethasone尤強，其抗炎症、抗過敏、抗風濕之效果極優越且無不良副作用，尚含有強效殺菌作用之Neomycin sulfate，所以本劑應用於眼睛感染、過敏性反應、外傷及手術後之種種情況具有改善及消炎的作用，能使症狀迅速好轉，獲得良好結果。本劑可作為眼科、耳鼻喉科治療及預防感染症用之局部治療製劑。

【成分】

Each gram contains:

Betamethasone.....2mg

Neomycin sulfate.....5mg

[Equivalent to Neomycin 3.5mg. (potency)]

【特點】

Betamethasone 應用於疾病上具有的特點及使用本劑之效果：

- (1) 以1/3或更少量的平均劑量，即具有Prednisolone、Prednisone或同等的抗炎症及抗過敏作用。
- (2) 無鈉或水份之滯留作用。
- (3) 無低鉀症狀。
- (4) 含強力抗菌作用之抗生素Neomycin sulfate，能應用於細菌性疾患之治療。

- (5) 對眼科之炎症性、滲出性、過敏性症狀發揮極強的效果外，並有抑制手術後之血管新生及肉芽增殖作用。
- (6) 對以往之腎上腺皮質荷爾蒙無從獲得充分的效果及因副作用不能繼續治療之患者，亦能發揮優異效果。
- (7) 本劑用於點眼時，毫無刺激感。

【適應症】

眼科疾患：眼瞼結膜疾患、角膜疾患、鞏膜疾患、脈絡膜疾患。

【用法用量】

通常一日1~3次，塗抹患部。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

- (1) 使用本劑，對Virus性結膜及角膜疾患、結核性眼疾患、真菌性眼疾患，或急性化膿性眼疾患，有使患部不顯性化或惡化之虞，故如有此等疾患之患者，如非必要，以不投與為原則。唯於必要投與時應慎重使用。
- (2) 連續投與本劑時，偶有眼內壓亢進的現象發生，故應慎重投與為要。
- (3) 投與本劑如發現過敏症狀時應即停止投與。

【包裝】

100公克以下軟管裝



溫士頓醫藥股份有限公司

台南縣永康市仁愛街117號