

褐黴素 乳膏 20 毫克/公克
FUSIDIC ACID Cream 20mg/gm "Sinp har"

作用效能：

Fusidic Acid 是一種具有強效抗菌作用的抗生素，對大部份的革蘭氏陽性菌有效，尤其是葡萄球菌，亦包括對盤尼西林或其他抗生素有抗藥性者，除了對各種皮膚感染症有卓效外，甚至應用於完整無傷口的皮膚，Fusidic Acid 亦具有滲透入感染病灶的獨特能力。應用葡萄球菌、鏈球菌或其他對 Fusidic Acid 敏感的細菌的皮膚感染症。

主成分：每公克中含有：

Fusidic Acid.20mg

賦形劑：

White Vaseline、Cetanol、Stearic Acid、Polyoxyethylene Cetyl Ether、Glyceryl Monostearate、Propylene Glycol Fatty Acid Ester、Propylene Glycol、Glycerine、Sodium Benzoate、Citric Acid 、Water Purified.

適應症：

葡萄球菌、鏈球菌或其他對 Fusidic Acid 敏感的細菌的皮膚感染症。

用法用量：

乳膏適量塗於患部，每日 2～3 次，一般持續塗 7 天，亦可依病情延長用藥的時間。

副作用：

耐受性良好，過敏反應極罕見。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第 049339 號

G-10022 號

包裝：100 公克以下鋁軟管、積層鋁管裝、塑膠罐裝，
450 公克與 1000 公克塑膠瓶裝

貯存：儲存於 30°C 以下