

可立信 凝膠 10毫克/公克

Kolincin Gel 10mg/g

【主 成 分】

每公克凝膠含10毫克的Clindamycin (as Phosphate)。

【賦形劑】 Carbopol 940、Propylene Glycol、Edetate Disodium、Purified Water

【適應症】

尋常性痤瘡。

【性 質】

Clindamycin Phosphate 在體外無作用，但在身體內立即分解成具有抗菌活性之Clindamycin。Clindamycin已被證實對面皰、青春痘有效，有面皰的人，使用本劑四星期後，其面皰的Clindamycin濃度達597µg/mg，在體外Clindamycin對引起面皰的粉刺出油酸桿菌(*Propionibacterium acnes*)之最低抑菌濃度(MIC)僅4µg/mg。使用Clindamycin後皮膚表面的游離脂肪酸由14%減至2%。

【用法用量】每日2次，薄敷於患部。

【注意事項】

副作用：

皮膚乾燥、接觸性皮膚炎、刺激（如紅疹、鱗屑剝落與灼熱感）、皮膚油膩、革蘭氏陰性毛囊炎、腹痛、腸胃不適。

禁忌：

對Clindamycin或Lincomycin有過敏歷史者、有區域性腸炎或潰瘍性結腸炎病歷、或有抗生素相關結腸炎病歷病人，請勿使用本劑。口服或注射Clindamycin可能會有嚴重的結腸炎，局部使用也可能會從皮膚吸收而有下痢、下血痢及結腸炎。如有因Clostridium difficile引起的偽膜性結腸炎，可用Vancomycin治療，通常是每天500mg至2g，分3-4次服用7-10天。Kolincin Gel含有醇基劑，會引起眼灼燒感與刺激；若意外接觸敏感的表體（眼、擦傷的皮膚、黏膜），則以大量自來水沖洗。

妊娠：致畸胎作用

使用100-600mg/kg/day範圍之Clindamycin皮下劑量，於大鼠及小鼠進行生殖研究，並無任何生育力受損或危及胎兒的證據。至今尚未有充分的對照的懷孕婦女的報告，除非有明確的須求，懷孕期間不可使用本劑。病人用藥期間不可哺乳。用於12歲以下兒童之安全性尚未建立。

【藥物注意事項】請貯存於25℃以下。

【包 裝】

100公克以下鋁管裝、塑膠罐裝、450公克、1000公克塑膠瓶裝。

本藥須由醫師處方使用。

衛署藥製字第 GMP G-7781 號。
045186

【製造廠】



中生生技製藥股份有限公司淡水廠
CBC Biotechnological & Pharmaceutical Co., Ltd.
廠址：251新北市淡水區埤島里行忠路120號
服務專線：(02) 8631-0018

SCD-071
02