



“杏輝”

PIC/S GMP 藥品

美康 乳膏 (清涼型)

MYCOMB Cream “Sinphar”

—— 綜合性皮膚疾患治療劑 ——

組成：每gm含有

Nystatin.....100,000 units
Neomycin (as sulfate)....2.5 mg(potency)
Gramicidin.....0.25 mg
Triamcinolone acetonide.....1.0 mg

賦形劑：

Propylene Glycol、Cetylstearyl Alcohol、White Soft Paraffin、
Liquid Paraffin、Span 60、Tween 60、Methylparaben、Water
Purified、Propylparaben、Paraffin Wax、Menthol、Arlacel 165、
Perfume (Ireine)。

作用特點：

- (1)本軟膏具有抗炎、止癢、殺菌和殺黴菌之四種不同藥理作用。
- (2)Triamcinolone Acetonide：為強力之賀爾蒙，具有消炎止癢及抗過敏之效能，可緩解皮膚之發炎症狀。
- (3)Nystatin：為抗念珠菌藥物，可用來治療由白色念珠菌和其他酵母類之黴菌引起之皮膚病症。
- (4)Neomycin及Gramicidin二種抗生素之配合不但具有更廣效性之殺菌作用，且對產生耐藥性之細菌，本配合之抗生素可具殺菌性。

適應症：濕疹、過敏性和發炎性皮膚病、續發性細菌或黴菌感染(念珠菌感染)。

用法及用量：將本軟膏塗擦於患處，每天二至三次。

注意事項：

- 1.不可用以點眼及在眼圍附近塗敷。
- 2.兩歲以下兒童之使用須詢問醫師或藥師。
- 3.濕疹、皮膚炎群、乾癬、掌趾膿疱症、燒傷症狀使用後如呈現浸潤、糜爛、結痂或產生二次感染者，應停用並立即就醫。
- 4.使用期間如出現搔癢、發紅、腫脹、丘疹或水疱等感染症狀時，應停用並立即就醫。
- 5.長期大量或大範圍使用時，可能出現等同副腎皮質荷爾蒙全身投與的不良反應。
- 6.孕婦：對於孕婦之安全性尚未確定，孕婦或可能懷孕之婦女避免使用，只有在潛在利益大於潛在的危險性的前提下才可使用。
- 7.授乳婦：尚未有足夠的實驗證據顯示此藥物會經由全身性吸收而分泌至母乳，授乳婦仍應慎用。

禁忌：

- 1.對Gramicidin，Nystatin，Neomycin具抗藥性及非感受性菌種所引起之皮膚症狀。
- 2.真菌、黴菌感染而帶有皮膚結核、疱疹、牛痘及水痘。
- 3.鼓膜穿孔之濕疹性外耳炎。
- 4.對本劑具過敏性者。

副作用：

- 1.皮膚感染症：有真菌症(白癬、念珠菌症)或neomycin，gramicidin，nystatin等具抗藥性或非感受性菌引起之感染症出現時，應停用並立即就醫。
- 2.長期使用時可能出現痤瘡樣發疹、皮膚炎、皮膚萎縮、紫斑、毛細血管擴張、多毛或色素消退等症狀時，應改換不含副腎皮質荷爾蒙之其他藥劑。
- 3.過敏性：時而出現皮膚刺激感或發疹，若症狀持續，應停用並立即就醫。
- 4.眼：使用於眼、臉部位時應注意可能引起眼壓高亢或青光眼。
- 5.大量且長期而廣範使用時，在密封法(ODT)下應注意可能產生對下丘腦-垂體-腎上腺軸的抑制作用。
- 6.長期使用：因可能出現胃障礙、耳腎毒性等副作用，應避免長期使用。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第021924號

包 裝：100公克以下鋁管裝。

100公克以下、450公克、1000公克塑膠瓶裝。



® 杏輝藥品工業股份有限公司

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN

消費者服務專線：(0800)015151

website : <http://www.sinphar.com>