

乃利爽 脂肪性軟膏

Nerisone Fatty Ointment

衛署藥輸字第 022754 號

本藥須由醫師處方使用

類固醇製劑

成份：

本品每公克含 diflucortolone valerate 1 公絲 (0.1%)

特性：

本品抑制炎症性和過敏性皮膚疾患，並改善自覺症狀，如：搔癢、灼熱、疼痛。它在治療上的優點是：作用迅速、加強消炎作用、極佳的皮膚耐受性，且藉由選擇為適合不同的皮膚狀況而配製的三種基劑中之一種基劑而發揮特殊的療效。

適應症：

濕疹、過敏性及接觸性皮膚炎、神經性皮膚炎、牛皮癬、皮脂溢出性濕疹、尿布疹、汗疹。

說明：

對外用類固醇治療有反應的所有皮膚疾病，如：接觸性皮膚炎、接觸性濕疹、職業性濕疹、尋常性、錢幣狀、變性及皮脂漏濕疹、失水性濕疹、靜脈曲張症狀的濕疹（但非直接在下肢的潰瘍）、肛門性濕疹、小孩的濕疹、神經性皮膚炎（內因性濕疹、異位性皮膚炎）、乾癬、疣狀扁平苔癬、圓板狀紅斑性狼瘡、一級燙傷、晒傷、蟲咬。

用法用量：

本藥須由醫師處方使用。

除醫師另有指示外，本品於開始治療時每日塗擦二次或三次最適宜。當臨床症狀改善後，通常每日塗擦一次已足。

嬰兒及四歲以下之幼童使用本品治療時最長不得超過三週，特別是當患處用尿布覆蓋時。

本品有三種劑型：乃利爽水溶性軟膏，乃利爽軟膏，乃利爽脂肪性軟膏。個別的皮膚病症應使用何種劑型則視皮膚的外觀而定；乃利爽水溶性軟膏適用於濕潤性皮膚疾患，乃利爽軟膏適用於既不是濕潤性也不是很乾燥的皮膚疾患，乃利爽脂肪性軟膏則適

用於很乾燥的皮膚疾患。

*乃利爽水溶性軟膏：

乃利爽水溶性軟膏含有很高的水份與低的脂肪成分，對於濕性皮膚疾患，它使得滲出物順暢地排出因而使病症迅速消退並使皮膚乾燥。

本品也適合塗擦於較濕潤性、外露的皮膚及身體多毛的部位。長期使用本品，如果皮膚過份乾燥，則患者必須改用含較多脂肪的製劑（乃利爽軟膏或乃利爽脂肪性軟膏）。

*乃利爽軟膏：

當皮膚疾患既不濕潤也不是很乾燥，則需脂肪與水份比例平衡的一種基劑。本品使得皮膚稍微潤滑而不保留熱度與水份。乃利爽的三種不同劑型中，軟膏具有最廣泛的使用範圍。

*乃利爽脂肪性軟膏：

對於極乾燥的皮膚疾患及慢性期，則需一種無水性脂肪基劑。本品基劑的封閉效果可促進病變的痊癒。封閉敷料：

對於特別頑固的皮膚病，可能需要封閉敷料。當使用封閉敷料時其處理應如下：在醫師認為何種劑型較適當而塗擦乃利爽製劑後，治療部位必須完全覆以塑膠箔紙，然後用絆創膏牢紮於鄰近周圍之健康皮膚上。塑膠手套可用於手的封閉。只要病人可能的話，敷料必須保持固定，但通常不超過 24 小時。如果有必要延長封閉治療，最好每 12 小時更換敷料。如果在封閉治療過程中發生感染，則必須中止封閉療法。

副作用：

當本品塗擦於廣大的皮膚表面（約 10% 以上）或長期使用（超過四週）可能會發生下列的反應：局部併發的症狀，如：皮膚萎縮、毛細管擴張、條紋、皮膚座瘡狀病變、口周圍皮膚炎、體毛的生長增加（多毛症）、因吸收所致的類固醇局部作用。罕見病例可能發生過敏性皮膚反應。

新生兒的母親在懷孕或授乳時（如：在懷孕的最後數週使用、腎上腺皮質功能降低）會大量或長期使用本品治療，則不能排除副作用的可能。

禁忌症與危險性：

治療的部位患有結核病或梅毒的病變、病毒疾患（如：牛痘、水痘、帶狀疱疹）。

含類固醇外用製劑的一般原則是不可用在懷孕的最初三個月，特別是應避免身體大量部位或長期的使用。

注意事項：

細菌性感染或黴菌感染的皮膚疾病，則需加上特別的療法。本品塗擦臉部時，切勿接觸到眼睛。如出現酒

渣鼻或口周圍皮膚炎，則本品不可用於臉部。醫師請參閱更詳細之醫學小冊。

包裝：

1000 公克以下軟管裝

藥品妥為貯存，放在兒童拿不到之處。

製造廠：Schering S.p.A.

廠址：Via E. Schering, 21-20090 Segrate, Milano, Italy.

藥商：台灣先靈股份有限公司

地址：台北市民生東路三段 117 號 10 樓

A754/0101

