

"培力" 宜痔平栓劑

Posuline Suppositories "P.L."

衛署藥製字第047029號GMP G-8598

[處方]: 每個栓劑含:

Policresulen 50 %.....200 mg

(Eq to Policresulen 100mg)

Cinchocaine HCl.....2.5 mg

[適應症]

痔瘡及肛門直腸裂隙和破裂所引起之疼痛、出血、搔癢及發炎。

[禁忌]

※對Cinchocaine過敏者不可使用。

※懷孕期必須估算出對母體及胎兒的全部可能危險。在絕對須要時才可以使用。

※動物試驗沒有發現任何畸胎形成，使用於懷孕婦女所可能的危險研究報告尚未提出，仍未知道主成份是否會存在哺乳母親的乳汁中。

[副作用]

在開始治療時偶有極輕微的局部不適。如癢、燒灼感。但通常能迅速消退，不須停藥。

[用法用量]

每天2~3次，每次1個，於排便後塞入。症狀消除後，可改為每天一個栓劑。本藥須由醫師處方使用。

[注意]

儲存於25°C以下。

注意包裝上的有效期限。

栓劑可能會變色以及包裝可能會破損，但不會影響產品的有效性。

儲存時必須小心，勿讓兒童觸及。

[包裝]

4~100粒紙盒裝

 培力藥品工業股份有限公司
台中市工業區六路十一號
電話: (04)23592576 (代表號)
傳真: (04)23590992

CH0016