

仿單

輕喉炎 口腔噴液劑 1.5毫克/毫升

2020-5-14

size 21x10cm

水蜜桃口味

10cm

PIC/S GMP優良藥品 GMP G-9095號

21cm

Qing-hou-yan Qing-hou-yan

衛署藥製字第047962號

水蜜桃口味

成大

清喉炎 口腔噴液劑 1.5毫克/毫升

Qing-hou-yan spray 1.5mg/ml "Chen Ta"

【成分】每毫升含

有效成分及含量：Benzylamine Hydrochloride 1.5毫克/毫升(0.15%)

其他成分(賦形劑)：Aspartame、Citric Acid、Sodium Benzoate、Artificial Peach Flavor、Purified Water。

【用途(適應症)】：緩解喉嚨及口腔部位的疼痛，如喉嚨痛、舌頭或牙齦疼痛、口腔潰瘍。

【使用上注意事項】：

一、有下列情形者，請勿使用：

1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
2. 苯酮尿症的人(Phenylketonurics)。

二、有下列情形者，請洽醫師診治：

1. 6歲以下。
2. 曾經被診斷有肝臟疾病、腎臟疾病的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
2. 正在使用其他藥品包含非處方藥的人。雖然目前尚無已知與其有交互作用之藥品。

四、其他使用上注意事項：

1. 勿超過建議使用量。
2. 為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。
3. 使用時請勿接近眼睛，若不小心接觸到眼睛請立即以大量清水清洗。
4. 本藥請勿連續使用超過一週。
5. 避免陽光直射。

【用法用量】：

成人及12歲以上	噴液劑每次噴4~8下，直接噴於疼痛及發炎部位。需要時，可每1.5~3小時使用一次。
6歲至12歲	噴液劑每次噴4下，直接噴於疼痛及發炎部位。需要時，可每1.5~3小時使用一次。
6歲以下	請洽醫師診治。
肝腎疾病的人	請洽醫師診治。

【警語】：

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
消化系統	麻木、灼熱、刺痛、口乾及口渴、味覺改變、噁心、嘔吐、胃腸道不適
神經系統	頭昏、頭痛、嗜睡

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用並接受醫師診治：

1. 若有任何不適情況產生。
2. 全身性過敏性反應，如皮膚起疹子、搔癢、紅斑、灼熱感、光過敏性皮膚炎、呼吸困難、喘息、咳嗽、呼吸有咻咻聲。
3. 自覺症狀沒有改善或更惡化。

【包裝】：100毫升以下，500、1000、3800毫升塑膠瓶裝。

【保存上之注意】：

- 一、本藥應置於小兒伸手不及處。
- 二、於25°C以下，避光儲存。
- 三、請在有效期限內使用。

【儲存條件】：25°C以下。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。



成大藥品股份有限公司

台南市麻豆區關帝廟80號