

吸菸

族群藥物動力學分析顯示尼古丁會增加口服Rivastigmine清除率約23%(75名吸菸者及549名非吸菸者)。

藥物交互作用試驗

Rivastigmine貼片並未執行特別的交互作用試驗， 以下提及之資訊是來自於口服Rivastigmine的研究。

Rivastigmine對其他藥品代謝作用的影响

Rivastigmine主要的代謝是經由羧酸酯酶的水解，極少量的代謝是發生在細胞色素P-450酵素。依據體外試驗結果，可預期與經由下列異構酶代謝的藥品不會產生藥物動力學上的藥品交互作用：CYP1A2、CYP2D6、CYP3A4、5、CYP2E1、CYP2C9、CYP2C8、CYP2C19或CYP2B6。在健康的志願者的研究上，口服Rivastigmine與Digoxin、Warfarin、Diazepam 或 Fluoxetine均沒有觀察到藥物動力學上的交互作用。服用Rivastigmine後，對於服用Warfarin所引起的凝血時間延長並沒有影響。

其他藥品對Rivastigmine代謝作用的影响

會誘發或抑制CYP450代謝作用的藥品會改變Rivastigmine的代謝。以825名病人資料所作的族群藥物動力學分析，顯示口服Rivastigmine若與其他一般處方的藥物併服如：制酸劑(n=77)、降壓藥(n=72)、β-阻斷劑(n=42)、鈣離子通道阻斷劑(n=75)、抗糖尿病藥(n=21)、非類固醇類抗炎藥(n=79)、動情激素(n=70)、水楊酸類止痛劑(n=177)、抗心絞痛藥(n=35)、抗組胺酸藥(n=15)，對 Rivastigmine的藥物動力學並不會改變。

12.臨床試驗資料(依文獻記載)

Rivastigmine Patch可用於治療阿茲海默氏病失智症，是依據下列臨床試驗的結果，三項以阿茲海默氏病人進行的具對照組設計的臨床試驗(試驗1和二項日本試驗)加上三項以口服Rivastigmine用於治療阿茲海默氏症病人的具對照組設計的臨床試驗(參閱"口服Rivastigmine的仿單內容")。

1) Rivastigmine Patch治療阿茲海默氏病失智症的路隨性、24週臨床試驗(試驗1)

這是一項以阿茲海默氏病人進行的隨機、雙盲、雙處理臨床試驗，阿茲海默氏病是依NINCDS-ADRD及DSM-IV診斷，且簡易心智測驗(Mini-Mental Status Examination：MMSE)分數≥ 10且≤ 20分。參加試驗的病人年齡範圍從50歲至90歲，平均年齡為74歲，女性約佔67%，男性為33%，種族包括75%白人、1%黑人、9%東方人及15%其他人種。

評估方法

試驗中以雙重的方式來評估Rivastigmine Patch的療效：評估認知功能的改變及整體臨床的效果。

以阿茲海默氏病認知評量表(ADAS-Cog)來評量Rivastigmine Patch對認知功能的改善程度。這方法在阿茲海默氏病病人的縱向世代追蹤研究中被廣泛驗證。ADAS-Cog對認知功能的評估包括記憶、方向感、注意力、推論、語言及運用能力等方面，分數由0至70分，分數越高，表示認知功能的破壞程度越大。正常老年人的分數可能低於0或1，但非失智症的人得分數高也很常見。

Rivastigmine Patch所產生的整體臨床效果，以ADCS-CGIC(阿茲海默症合作研究-臨床總體改變量表)來評估。ADCS-CGIC是CIBIC-Plus(Clinician's Interview-Based Impression Of Change-Plus)更標準化的表格，以7分來作分類性的評比，分數由1分開始計算，1分表示明顯改善，4分表示沒有改變，7分表示明顯惡化。

試驗結果

在這項臨床試驗中，1195名病人隨機分配至下列四組之中一組：Rivastigmine Patch 10(9.5 mg /24h)組、Rivastigmine Patch 20(17.4 mg /24h)組、Rivastigmine 膠囊(劑量 6mg BID)組或安慰劑組。此24週的試驗，前16週為劑量調整期，後8週為維持劑量期。分配到藥品治療組的病人，在維持劑量期，若耐受性不佳時，允許其劑量低於原先預定的標的劑量。

ADAS-Cog

圖3為24週的試驗中，與基值比較，各組ADAS-Cog分數的變化。於第24週，Rivastigmine Patch 10(9.5 mg /24h)、Rivastigmine Patch 20(17.4 mg /24h)和Rivastigmine 膠囊組與安慰劑組相比的平均差異分別為1.8、2.9和1.8分，各治療組和安慰劑組的差異具統計意義。雖然此評估指標結果顯示Rivastigmine Patch 20(17.4 mg /24h)相較於Rivastigmine Patch 10(9.5 mg /24h)表現稍佳，惟在另一評估指標ADCS-CGIC，整體評估結果兩組的差異不具意義(見圖4)。




圖3：試驗1中病人的ADAS-Cog分數於每個時間點與基值比較的改變值

ADCS-CGIC

圖4為所有四組病人ADCS-CGIC分數的分佈長條圖。於第24週，各個Rivastigmine治療組和安慰劑組比較ADCS-CGIC分數平均差異為0.2分。各個Rivastigmine組和安慰劑組的差異具統計意義。




圖4：試驗1中完成試驗的病人ADCS-CGIC分數分佈情形

Rivastigmine Patch的日本24週安慰劑對照臨床試驗(日本試驗)

以輕度及中度(Mini-mental state examination(MMSE)簡易智能量表：10-20分)的阿茲海默型失智症為對象進行本藥品的安慰劑對照雙盲試驗(24週投予)的概要如下。

認知功能檢查(ADAS-J cog)

第24週相較於基期值的平均變化量，在安慰劑組為1.3分、Rivastigmine Patch 10組為0.1分，安慰劑組與Rivastigmine Patch 10組的差異具統計顯著性(p = 0.005；共變數分析)。

表4：於日本試驗各組治療24週ADAS-J cog改變值的比較

		安慰劑	Rivastigmine Patch 5	Rivastigmine Patch 10
		N=268	N=269	N=273
基值	評估病例數 ^{a)}	265	266	268
	平均值 (SD)	24.8 (9.46)	25.2 (9.62)	25.0 (9.93)
第24 週	平均值 (SD)	26.1 (11.49)	25.7 (11.70)	25.1 (11.25)
改變值 ^{b)}	平均值 (SD)	1.3 (5.07)	0.5 (4.96)	0.1 (5.04)
(第24 週－基值)	LSmean(SE) ^{c)}	1.3 (0.31)	0.5 (0.31)	0.1 (0.30)
各組間差異	LSmean(SE) ^{d)}	-	-0.8 (0.43)	-1.2 (0.43)
(Rivastigmine－安慰劑)	95% CI ^{e)}	-	(-1.7 to 0.0)	(-2.1 to -0.4)
	p 值	-	0.063	0.005

N：有效評估病例數

SD：標準偏差 SE：標準誤差 LSmean：最小平方方法估計

a)有效評估病例：同時有接受基期及基期後評估的受試者。

b)分數減少表示有改善。

c)LSmean與LSmean的95%信賴區間，係以治療組別為因子，ADAS-J cog基期為共變數的共變數分析模型來估計。

全事件臨床評估(CIBIC Plus-J)

在治療24週時的全事件臨床評估中，安慰劑組與Rivastigmine Patch 10組間，在統計學上並無顯著差異(p = 0.087；Wilcoxon排序和檢定)。

表5：日本試驗各組治療24週時的CIBIC Plus-J比較

	安慰劑	Rivastigmine Patch 5	Rivastigmine Patch 10
	N=268	N=269	N=273
有效評估病例數 ^{a)}	267	269	273
平均值(SD)	4.4 (0.94)	4.2 (0.96)	4.2 (0.96)
Score－n (%) ^{b)}			
(1)大幅改善	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
(2)中度改善	5 (1.9)	12 (4.5)	6 (2.2)
(3)稍微改善	36 (13.5)	45 (16.7)	53 (19.6)
(4)症狀無變化	111 (41.6)	109 (40.5)	109 (40.4)
(5)稍微惡化	84 (31.5)	82 (30.5)	78 (28.9)
(6)中度惡化	29 (10.9)	21 (7.8)	22 (8.1)
(7)大幅惡化	2 (0.7)	0 (0.0)	2 (0.7)
p 值	-	0.063	0.067

N：有效評估病例數

SD：標準差

a)有效評估病例：有接受基期後評估的受試者

b)係以有效評估病例數為分母算出

Rivastigmine Patch的日本24週比較不同治療劑量的臨床試驗(日本試驗)

治療24週的雙盲試驗，比較輕至中度(MMSE：10-20分)阿茲海默氏症病人以2種不同的劑量調整方式治療的耐受性：1-Step(以Rivastigmine Patch 5 cm²一天一次為起始劑量，治療4週後，調整至Rivastigmine Patch 10 cm²，維持治療劑量為Rivastigmine Patch 10cm²一天一次)，和3-Step(以Rivastigmine Patch 2.5 cm²一天一次為起始劑量，接著每4週增加2.5 cm²劑量，直至調整劑量至Rivastigmine Patch 10cm²一天一次)。

因不良事件而停止試驗的發生率

因不良事件而停止治療的發生率，1-Step組為15.0%(16 /107受試者)，3-Step組為18.5%(20 /108受試者)。因不良事件而停止治療，兩組發生率的差異為-3.6%(95% CI：-17.0, 9.6)。

13.包裝及儲存

13.1 包裝

每片10平方公分貼片，含有18毫克Rivastigmine Base，罐內釋放速率為9.5毫克/24小時。30片鋁箔袋包裝。鋁箔袋材質(由外層到內層)為紙/PET/Aluminium/抗化學性膜。

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

儲存於25℃以下。

13.4 儲存注意事項

須置於小孩接觸不到之處。

14.病人使用須知(依文獻記載)

為確保使用Rivastigmine Patch的安全性及有效性，應將後面段落所載的病人資訊及用藥指導提供病人參考，並和病人討論。

正確使用的重要性

應告知病人及照護者正確使用劑量及粘貼部位的重要性。貼片粘貼的部位應輪流替換以減少皮膚的刺激性，相同的部位在14天內不可重複粘貼，在不同部位的皮膚貼上新的貼片前，應先將前一天貼的貼片撕下來。貼片應每24小時更

換一片，且每日粘貼的時間應一致，若將之排入每日固定的作息時間表，例如洗澡或沐浴，可能會有幫助。一次只能貼一片貼片。應告知病人及照護者避免將貼片長時間曝露在外部的熱源(過度日晒、三溫暖、日光浴)。

忘記用藥

告知病人如果忘記用藥時，應立即貼上新的貼片，到了隔天的給藥時間，再換貼另一片貼片，不可同時貼二片來補償忘記貼的劑量。

若忘記用藥時，如未照護者，應告知病人，聯絡醫師有關重新治療的方法。

貼片的妥善

應告知病人及照護者，貼片使用後，要將貼貼面向內對摺，放進原來的貼片保護袋中，丟棄在兒童及寵物看不到及無法取得的地方，並應告知在使用24小時後，貼片上如有藥殘留，要避免接觸到眼睛，處理完貼片後要洗手。若不慎觸碰到眼睛，或處理完貼片後眼睛變紅，應立刻以大量清水沖洗，若症狀未解除，應尋求醫療協助。

有關副作用作用

應告知病人及照護者可能發生胃腸道副作用，例如噁心、嘔吐及腹瀉，包括可能因這些症狀而發生脫水。向病人解釋Rivastigmine Patch可能會影響食欲及／或體重。告知病人及照護者應觀察是否發生副作用，尤其在開始治療或增加劑量時。告知病人和照護者，如果這些副作用持續發生時，應告知醫師。

皮膚反應

告知病人或照護者可能發生過敏性接觸性皮膚炎。應告知病人或照護者，若發生下列情況時，應通知醫師：貼貼部位皮膚反應擴散至貼片範圍以外、更嚴重的局部反應(例如發紅變多、水腫、丘疹、水疱)、及貼片撕下後48小時內症狀未明顯改善。

與總體作用劑藥品併用

應告知病人及照護者，使用Rivastigmine Patch時，不可再服用Rivastigmine膠囊或Rivastigmine口服液劑及其他具有膽鹼作用的藥品。

病人資訊

Rivastigmine貼片只適用於皮膚

什麼是Rivastigmine貼片？

Rivastigmine 貼片是一種處方藥物，用於治療：

• 與阿茲海默氏失智症相關的中度至中度記憶問題(失憶)

根據6-12個月的Rivastigmine Patch臨床試驗結果，顯示對認知(包括記憶力，理解溝通、推論能力)及做日常工作有幫助。Rivastigmine Patch並非對所有的人都有效，有些人以Rivastigmine Patch治療後可能會：

- 似乎改善許多
- 有些改善或維持原狀
- 有惡化但速度較預期慢
- 未改變病情，然後如預期的惡化
- 病人並未獲益於Rivastigmine Patch的治療。Rivastigmine Patch並不能治療阿茲海默氏症；所有的阿茲海默氏症病人的症狀都會隨著時間惡化。Rivastigmine Patch所產生的食皮吸收系統會讓Rivastigmine成份經由皮膚吸收。目前尚不確定Rivastigmine貼片對18歲以下孩童是否安全或具有療效。

哪些人不宜使用Rivastigmine貼片？

若有下列情形，不可使用Rivastigmine Patch：

• 若您對Rivastigmine、carbamate衍生物，或Rivastigmine貼片中的任何成份過敏，請勿使用Rivastigmine貼片。詳見本須知單末尾所列的Rivastigmine貼片過敏成分。

- 曾對Rivastigmine貼片治療發生下列皮膚反應：
 - 皮膚反應擴散至Rivastigmine貼片範圍之外
 - 曾起水疱、皮膚發紅變多、腫脹
 - 撕下Rivastigmine貼片後48小時內症狀未好轉

若您無法確認是否可以使用Rivastigmine貼片，請詢問您的醫護人員。

使用Rivastigmine貼片前，我應該告訴我的醫護人員哪些事項？

• 若您有以下情形，使用Rivastigmine貼片前請告知您的醫護人員：

- 目前正接受或曾經患胃潰瘍
- 預定進行手術
- 目前或過去曾有心臟方面的問題
- 有排尿方面的問題
- 目前或過去曾有癱瘓問題
- 有動作方面的問題(震顫)
- 有氣喘或呼吸方面的問題
- 食慾低落或體重持續減輕
- 以前曾對Rivastigmine(Rivastigmine貼片的成份)產生皮膚反應
- 其他醫療狀況
- 懷孕或有懷孕的計畫。目前尚不確定Rivastigmine貼片的成份是否會傷害您未出生的嬰兒。若您懷孕或有懷孕的計畫，請與您的醫護人員討論。
- 正在哺乳或有哺乳的計畫。目前尚不確定Rivastigmine貼片的成分是否會進入您的乳汁。若您使用Rivastigmine貼片，請與您的醫護人員討論是否繼續使用Rivastigmine貼片治療或為哺乳而停止使用Rivastigmine貼片，不應使用Rivastigmine貼片且同時哺乳。

請告訴醫護人員服用的藥物，包括處方藥、非處方藥、維生素及中草藥物。特別若您服用以下藥物時，請告知您的醫護人員：

- 治療發炎的藥物(非固醇類抗炎發藥物)
- 其他治療阿茲海默氏失智症或帕金森氏症的藥物。
- 抗癲癇類藥物，如過氧樂、威盲藥、治療膀胱或腸道痙攣的藥物，或某些氣喘用藥，或某些預防暈車的藥物。
- Metoclopramide，常用作緩解噁心、胃食道逆流、手術或化療後的噁心嘔吐的藥物。
- 若您不確定您是否使用上方所列藥物，請詢問您的醫護人員。
- 請確認您所使用的藥物，請列出藥物清單，並在取得新藥物時將清單提供予您的醫護人員與藥師。

我該如何使用Rivastigmine貼片？

- 遵照您的醫護人員告訴您的方式正確使用Rivastigmine貼片。
- Rivastigmine貼片有兩種劑量。
- 如有必要，您的醫護人員可能會調整您的劑量。
- 一次只貼一片Rivastigmine貼片。
- Rivastigmine貼片只適用於皮膚。
- Rivastigmine貼片應貼在乾淨、乾燥、無毛且無發紅、刺激疼痛、燒傷或割傷的健康皮膚上。
- 避免將Rivastigmine貼片貼在會與貼身衣物造成摩擦的身體區域。
- 勿將Rivastigmine貼片貼在塗有乳霜、乳液或撲粉的皮膚上。
- 請於每天同一時間，每24小時更換一次您的Rivastigmine貼片。貼上貼片前，可用原子筆在Rivastigmine貼片上寫下您貼附的日期與時間，以幫助您記得應移除貼片的時間。
- 每天更換貼附的部位，以避免刺激皮膚。您可以貼在相同的區域，但同一個貼附貼處應至少隔兩週的日期應至少更換約14天。
- 進行洗澡、游泳或淋浴等活動時，請檢查貼片是否鬆脫。
- Rivastigmine貼片的設計是在貼上時將藥品運送至身體，若您將Rivastigmine貼片在需要更換的時間以前掉了，立刻貼上新的貼片，並於隔天同一時間換上新的貼片。已經鬆脫的貼片請勿使用覆蓋物或以繃帶或膠帶固定，亦請勿將掉落之貼片再貼回去。
- 若您漏貼一片或忘記更換您的Rivastigmine貼片，請於記起時立刻貼上下一片Rivastigmine貼片。請勿為了補貼而同時貼上2片Rivastigmine貼片。
- 若您漏貼Rivastigmine貼片已超過一天，請在貼上新貼片之前聯絡您的醫護人員。您可能需要以較低劑量的Rivastigmine重新開始治療。
- 貼上新的Rivastigmine貼片之前，請務必先將前一天的舊貼片。
- 如果您的身上有兩片以上的貼片，會導致您吸收過量的Rivastigmine。若您不慎同時使用兩片以上的Rivastigmine貼片，請立刻聯絡您的醫護人員。如果您無法聯絡到您的醫護人員，請與當地毒物管制中心聯繫，或立刻前往最近醫院的急診室。

使用Rivastigmine貼片時應避免那些事情？

• 結構Rivastigmine貼片後不可摩擦眼睛。若不慎觸碰到眼睛或在處理貼片後眼瞼發紅，請立刻以大量清水沖洗，症狀若未消除時，尋求醫療協助。

• Rivastigmine貼片會導致困倦、眩暈、虛弱或昏暈。在瞭解Rivastigmine貼片對您的影響之前，請勿駕駛或操作重型機械或從事其他高風險性活動。

• 避免長時間曝露在熱源例如過度日曬、三溫暖、或日光浴光。

Rivastigmine貼片可能的副作用有那些？

Rivastigmine貼片可能導致的嚴重的副作用包括：

- **藥物過量。**在同一時間不慎貼上超過一片的貼片，可能會導致住院，或在罕見的狀況下可能會導致死亡。在貼上新的貼片前，先撕下舊的貼片是很重要的。不可在同一時間貼上超過一片貼片。
- **胃或腸道(小腸)方面的問題**，包括：
 - 噁心
 - 食慾減低
 - 嘔吐
 - 體重減輕
 - 腹瀉
 - 胃出血(潰瘍)
 - 脫水
- **皮膚反應。**有些人使用Rivastigmine貼片後曾發生過敏性接觸性皮膚炎的嚴重皮膚反應。若您皮膚反應擴散出貼片的範圍，或症狀加重，或撕下貼片後48小時內症狀未改善時，請停止使用Rivastigmine貼片，並立刻聯絡您的醫師。過敏性接觸性皮膚炎的症狀可能十分強烈，包括：
 - 瘙癢、發紅、腫脹、皮膚發熱或敏感
 - 脫皮或起水，且可能有滲出液體或結痂
- **心臟方面的問題**
- **癱瘓**
- **動作方面的問題(顫抖)**

Rivastigmine貼片最常見的副作用包括：

- 憂鬱
- 頭痛
- 焦慮
- 眩暈
- 胃痛
- 尿道感染
- 肌肉無力
- 疲倦
- 睡眠障礙

若您因任何副作用而造成不適或副作用持續出現，請告訴您的醫護人員。以上所列症狀並非Rivastigmine貼片所有可能的副作用。請詢問您的醫護人員或藥師以取得更多資訊。

我該如何存放Rivastigmine貼片？

- 將Rivastigmine 貼片存放在25℃以下。
- 準備使用Rivastigmine貼片之前，一律將貼片存放在密封的封袋內。
- 存放Rivastigmine貼片與所有藥物的處所應遠離孩童活動區。

關於安全與有效使用Rivastigmine貼片的一般資訊

有些處方的開立目的並未列於病人須知單上。請勿在未開立處方的情形下使用Rivastigmine貼片。即使其他人與您的症狀相同，也請勿將Rivastigmine貼片提供給他人使用，如此可能會對他們造成傷害。


此份病人須知單彙整了關於Rivastigmine貼片的各項重要資訊。如您欲取得更多的資訊，請與您的醫護人員討論。您可以洽詢您的藥師或醫護人員，取得更多提供予醫療專業人員的Rivastigmine貼片相關資訊。

使用說明及處置

我應該將Rivastigmine貼片貼在哪處？

- 在使用Rivastigmine貼片之前，請確認您的皮膚是：
 - 乾淨、乾燥和無毛髮
 - 無塗抹粉末、油、保潔霜、或乳液(會使貼片無法粘牢在皮膚上)
 - 無割傷、疤痕及／或刺激疼痛
- **每24小時要換貼片**，在貼上新的貼片前，請輕輕撕下舊的Rivastigmine貼片。身體貼了多片貼片會使您的藥量蓄積過多而可能發生危險。
- 每天只貼一片貼片，在下圖所示各區域中選擇一處貼上一片Rivastigmine貼片：
 - 上臂、左臂或右臂
 - 上背部、左側或右側
 - 胸口、左邊或右邊
 - 下背部、左側或右側

避免貼在會被衣服磨擦的地方。



更換貼片時，應先將前一天貼的貼片撕下來，才可在不同的皮膚區域貼上新的貼片(例如一天貼身體的右側，隔天貼身體的左側)。然而，連續貼片可以貼在相同的解剖學位置(例如，如果第一片是貼在右上手臂，下一片可以貼在左上手臂或是右上手臂的另一個點)。相同的點於14天內不可再貼新的貼片。