



人人 銀磺胺 乳膏 1% (磺胺嘧啶銀)

Silva-Sulfa 1% Cream-GCPC (Silver Sulfadiazine)

衛署藥製字第 026703 號

本品主成分 Silver Sulfadiazine 為能降低二級、三級燒傷併發感染症之發病率及死亡率的藥物，其抑菌範圍廣及革蘭氏陽性菌、革蘭氏陰性菌、黴菌及濾過性病毒。

其作用係為與細菌之細胞膜以及細胞壁結合，引起細胞壁之變形，損害細胞膜之功能，此種作用機構與其他銀化合物及磺胺嘧啶者截然不同，故迄今尚未發現有任何抗藥性之菌種報告。

「成分」：本品每公克含

Silver Sulfadiazine 10mg

「適應症」：

二級或三級燒傷所引起革蘭氏陽性菌、陰性菌之感染。

「注意事項」：

(1) 凡磺胺類藥物均有增高核性黃疸之可能，故足孕期間，早產或新生嬰兒之第一個月內，均不宜敷用本品。

(2) 凡對本品有過敏性之經歷者，使用本品極應小心。現尚未知本品與其他磺胺藥物是否具有交叉過敏性，如果過敏性反應係由使用本品而來則應首先考慮停藥。

體內缺乏 Glucose-6-phosphate dihydrogenase 之患者，使用本品可能會造成溶血。

(3) 孕婦使用本品的安全性尚未確立，所以育齡婦女，除非燒傷達全身總面積 20% 以上，或使用本品的需要與本品可能對胎兒所肇致的危險相較，權衡輕重，始能使用。

(4) 當細菌繁殖率降低之同時，於火傷處焦痂之內或其下方可能有黴菌移生；但黴菌之散佈極為罕有。

(5) 本品用治廣泛面積的皮膚燒傷時，血清中含硫量可能達到成人的治療劑量

(8-12mg%)。因此患者應予驗血以測知其血清中的硫含量，腎臟功能及尿中有無硫結石也應注意。

(6) 若腎功能及肝功能不健全，本品之排除率降低，可能在體內造成蓄積作用，此時應考慮停藥。

(7) 本品若與蛋白分解酵素合用時，應考慮金屬銀可能使此酵素失效。

(8) 在用本品治療時，有相當量 Silver Sulfadiazine 為人體所吸收，故有關磺胺藥物所肇致之不良反應甚可能發生。

(9) Sulfonamide 會增加患者產生核質性黃疸 (Kernicterus) 所以 Silver Sulfadiazine 不可使用於即將分娩的孕婦，早產兒或未滿月的嬰兒。

「用法用量」：

傷口經清潔處理後，以帶上無菌手套之手指或無菌藥刀等將本藥膏直接塗布於傷處形成一層厚約 3-5mm 之薄膜。一日一至二次使用，塗布完畢後可以加以包紮或不加以包紮，但如有藥膏脫落情形，應即時加以補塗藥膏。本藥須由醫師處方使用。

「包裝」：

1000 公克以下瓶裝、管裝。



人人化學製藥股份有限公司

中壢市南園二路三號

