

“五洲”完疲痠痛凝膠 10 公絲

TORICAM GEL 10 mg “U-CHU”

本劑為非類固醇抗炎劑，同時具有止痛及解熱作用，不論發炎原因為何本劑均有效，據推論可能是經由對發炎媒介物前列腺的合成抑制而產生上述效果，臨床研究證實本劑對外傷運動傷害或手術後的疼痛都有效果。

[成 分] 每公克中含有：

Piroxicam..... 10 mg

[適 應 症]

類風濕性關節炎、骨關節炎、（關節痛、退化性關節炎）僵直性脊椎炎、急性肌肉骨骼損傷和急性痛風、肌肉痛、外傷後之腫脹及疼痛。

[用法用量]

取本劑適量，塗抹患部，一日數次。

（取適量凝膠，以手輕輕地將凝膠塗擦於患部及其周圍處，直至凝膠快乾的時候，再取適量的凝膠繼續塗擦，依前述方法重覆塗擦凝膠 2~3 次後，俟凝膠自然乾爽時，即完成一次擦藥的動作。一天擦藥 2 或 3 次）

[包 裝]

1000 公克以下鋁管裝、罐裝。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第 039429 號

GMP 優良藥品 G-5006 號