

喘寶定量吸入劑 操作說明

準備作業

第一次使用吸入器之前，應釋放一劑藥物至空氣中，以確保吸入器妥善運作。



吸入器使用步驟

吸入時請處於站姿或坐姿。



/// 結束後

請以水潤洗口腔或漱口（不可吞下）。



如果您發現自己很難在開始吸氣時使用吸入器，可以搭配使用 AeroChamber Plus 輔助器裝置。

/// 吸入器使用之常見問題



如何儲存喘寶？

在醫療院所裡喘寶是存放在冰箱（2 - 8°C），當您領藥後，在未開封的情況下，請保存於冰箱（2 - 8°C）。開封後，只要保存在室內陰涼處（25°C 以下），最長可存放 4 個月。



掃描上方 QR code
觀看喘寶衛教影片



參考資料：喘寶定量吸入劑中文仿單。

喘寶定量吸入劑 100/6/12.5 mcg/dose

衛部藥輸字第 027672 號

【主要成分】Beclometasone dipropionate/formoterol fumarate dihydrate/glycopyrronium bromide。【適應症】用於重度以上呼吸氣流受阻（FEV₁ 少於預測值之 50%）及有惡化病史之慢性阻塞性肺病（COPD）成年病人，在已使用吸入型皮質類固醇與長效 beta₂ 致效劑合併療法仍未得到充分治療時，作為維持治療使用，以控制症狀及降低反覆惡化發生。【用法用量】成人建議劑量為每天兩次，每次吸入兩劑。最大劑量為每天兩次，每次吸入兩劑。【不良反應】最常通報的不良反應是口腔念珠菌症、肌肉痙攣、口乾。【禁忌症】對活性物質或對任一賦形劑（Ethanol anhydrous、Hydrochloric acid、Norflurane）過敏。

本藥需經醫師處方，詳細資訊請見仿單內容



友華生技

友華生技醫藥股份有限公司
地址：台北市大安區復興南路一段 368 號 3 樓
TRIMBOW-DA-202001

資料僅供醫護專業人員參考