

體 液 用 藥
“濟生” 舒 力 得 注射液
SORLATE INJECTION “CHI SHENG”

成 分 每ml中含：

Calcium Chloride	0.20mg
Potassium Chloride	0.30mg
Sodium Chloride	6.00mg
Sodium Lactate	3.10mg
d-Sorbitol	0.05gm

電解質組成(mEq/L)：

Na⁺130, K⁺4, Ca⁺⁺3, Cl⁻109, Lactate⁻28。

PH：5.5~7.5。

滲透壓比：約2

作 用

- 1.本藥之電解組成與細胞外液近似，可作為水份，電解質及糖質之補給用。
- 2.手術、休克引起之循環血液量之損失或體液之喪失，如適時使用與血漿或細胞外液之電解質組成近似之本藥，可得較佳療護效果。
- 3.本藥所含之乳酸鈉，在體內代謝成HCO₃⁻，能補正酸中毒症。
- 4.本藥所含之Sorbitol其代謝與Insulin無關，且不受手術前、手術後之影響，為能源補給之良藥。

適 應 症

循環血液量及組織間液減少時細胞外液之補充劑，代謝性酸中毒的治療及能量補給。

用法用量

一次500~1000ml靜脈點滴注射，注射速度以Sorbitol計算每小時每公斤體重以0.5g以下為宜。
本藥限由醫師使用

注意事項

- 1.禁忌：乳酸血症患者，遺傳性果糖不耐症患者。
- 2.慎重投藥：因腎疾患而致腎不全之患者，心不全患者，重症肝障害患者，高張性脫水症患者，因閉塞性尿路疾患而致尿量減少之患者。
- 3.副作用：大量急速給藥時可能引起腦浮腫、肺水腫、末梢浮腫。
- 4.適用上注意：因含有鈣鹽，如與加檸檬酸鹽之血液相混，可能引起凝血；與磷酸及碳酸離子能生成沈澱；故不宜與含有此等成份之藥品配合。藥液如不澄清，絕不可使用。
- 5.取用時：
 - (1)運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動若發現有上述情形時，請勿使用。
 - (2)若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。
- 6.輸液套選用及插入法：
 - (1)請依輸液套使用方法正確使用。
 - (2)請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。
 - (3)使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

包 裝

※本產品請遮光保存於陰涼處所
玻璃瓶裝：500ml，10支，20支裝
塑膠袋裝：250ml，500ml，1000ml，10支，20支裝
塑膠瓶裝：250ml，500ml，1000ml，20支，30支裝

衛署藥製字第040045號



濟生化學製藥廠股份有限公司
CHI SHENG CHEMICAL CORPORATION

編號
3434

新竹縣湖口鄉新竹工業區實踐路3號
電話：(03)5 9 8 3 8 1 1 (代表)