

"壽元"妥敏爽注射液 (妥內散敏)

TRANEXAMIC ACID INJECTION "S.Y."

衛署藥製字 第 021709 號

限由醫師使用

版本日期 2026-03-27

1 性狀

1.1 有效成分及含量

(Each mL contains) :

Tranexamic Acid.....50mg

1.2 賦形劑

Sodium Hydroxide, Hydrochloric Acid, Water for Injection。

1.3 劑型

注射液。

1.4 藥品外觀

無色至微黃色的澄清液體。

2 適應症

全身及局部出血或出血性疾病。

3 用法及用量

3.1 用法用量

通常成人1日250~500mg(5~10ml)分1~2次靜注或肌肉注射，
手術中，手術後如有必要1次500~1000mg(10~20ml)靜注，
或500~2500mg(10~50ml)點滴靜注。本藥限由醫師使用。

3.2 調製方式

無需調製。

4 禁忌

對本製劑所含之任何成分過敏者，不可使用。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

1. 給下列病人服用時宜慎重:有血栓症之病人(腦栓塞、
血栓性、靜脈炎等)及有引起血栓症之虞之病人。
2. 使用時注意事項:宜緩慢地靜脈注射(如急速注射，偶或有噁心、
胸內不舒感、心悸亢進、血壓降低等現象)(注射時而已)。

7 交互作用

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

1. 胃腸方面:有時噁心、食慾不振、下痢、胃中燒灼感(口服時而已)。
2. 皮膚方面:有時有搔癢、發疹現象。
3. 其他:昏昏欲睡感。

8.2 臨床試驗經驗

目前尚無資訊。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

目前尚無資訊。

10.2 藥效藥理特性

10.2.1 抗胞漿素(Plasmin)作用:本劑經生體內及生體外試驗皆顯示有抗Plasmin作用。

10.2.2 抑制出血作用:由於具有抗Plasmin作用,可阻止線維素溶解酵素作用,而抑制出血。

10.2.3 抗過敏性作用及抗炎症作用。

10.2.4 毒性低。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

2mL×100A 5mL×50A 20mL×10A 20mL×50A

2、5、20毫升100支以下小瓶裝

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

請儲存於30°C以下。

製造廠

壽元化學工業股份有限公司

嘉義市西區湖內里新民路128號

藥商

壽元化學工業股份有限公司

嘉義市西區湖內里新民路128號