



舒得清注射液100毫克/毫升

Ancare Injection 100mg/ml

衛署藥製字 第 057289 號

限由醫師使用

版本日期 2023-11-28

1 性狀

1.1 有效成分及含量

Each ml contains :
Acetylcysteine... 100 mg

1.2 賦形劑

EDTA、Sodium hydroxide、Glacial acetic acid、Water for injection。

1.3 劑型

注射液。

1.4 藥品外觀

澄清無色藥液。

2 適應症

減少呼吸道黏膜分泌的黏稠性，蓄意或偶發之Acetaminophen中毒之解毒劑。

3 用法及用量

3.1 用法用量


【依文獻記載】

- 肌肉注射：成人每次3毫升本品，每天1~2次。注射於肌肉深部，依照症狀決定，年幼小兒使用量減半。本藥之接受度及忍受度甚高，可長期使用。
- 靜脈注射(acetaminophen中毒之解毒)：起始劑量：150 mg/kg與等量5%葡萄糖水溶液，靜脈灌注15分；隨後劑量：50 mg/kg，4小時內灌注；最後劑量：100 mg/kg，16小時內灌注。
- 噴霧投與：成人每次3毫升本品，每天1~2次，使用5-10日。因本藥安全度高，可由醫師視臨床情況及治療效果，在容許之範圍內對投與次數及劑量，作適當之調整。小孩不須減量使用。
- 支氣管內點滴：依選擇之使用型態(永久管、支氣管鏡等)，每次3毫升本品，每天1-2次或視需要增加。
- 耳囊或其他腔之點滴及洗滌：1次使用1.5毫升至3毫升本品。

4 禁忌

【依文獻記載】

對Acetylcysteine過敏之患者。



5 警語及注意事項

【依文獻記載】

5.1 警語/注意事項

(1) 開瓶後請立即使用。

(2) 注射部位偶有燒熱感。

(3) 凡支氣管氣喘，呼吸機能不全患者要小心使用。

(4) 投與本藥後，支氣管液樣分泌物可能增加。如果咳嗽不完全時，呼吸通道必要時應以機械抽痰式來保持暢通。

當有其外來物質或局部累積物質而阻塞呼吸道的情況，可考慮或藉用支氣管窺鏡或不藉用支氣管窺鏡，悉以氣管內抽吸裝置導氣。支氣管氣喘，呼吸機能不全患者及高齡者，要小心使用。如發生支氣管痙攣時，請即中止使用本劑。

(5) 打開本藥之硫磺味為主成分本身之氣味，並非表示本藥變質，請安心使用。

(6) Acetylcysteine溶液(存於已開啟之安瓿或將之抽入於噴霧器中)會顯出粉紅色，但不影響本藥之有效度。

Acetylcysteine與某些物質會起化學反應(如橡膠、鐵、鋼)，因此噴霧器具要用玻璃或塑膠製的，使用後需以水洗滌。

(7) 併用抗生素時，應分別使用，抗生素以注射或口服投與。

7 交互作用

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

【依文獻記載】

8.1 臨床重要副作用/不良反應

包括口炎、噁心、鼻溢。對本劑過敏者，極為罕見。凡有氣喘者，可併用 Bronchodilator 而減輕因投與本藥後所可能引起的支氣管痙攣現象。全身投與本藥，偶有下述之過敏反應 - 蕁麻疹，罕見有支氣管痙攣。倘使噴霧治療過程中，引起鼻咽及胃腸之刺激就可能出現鼻炎、胃炎、噁心、嘔吐等。

8.2 臨床試驗經驗

目前尚無資訊。

9 過量

目前尚無資訊。


10 藥理特性

【依文獻記載】

10.1 作用機轉

本藥能破壞組成類黏蛋白的黏度及痰和其他含膿分泌物之黏蛋白和核酸複合物的聚合，對粘液以及膿毒性黏液有迅速和強力之液化作用。

10.2 藥效藥理特性



本藥比一般酵素類之效果顯著且持久，且無刺激性，耐受性高。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

3、5、10毫升玻璃安瓿裝，100支以下盒裝。

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

請於25°C以下，陰涼處儲存。

製造廠

南光化學製藥股份有限公司

台南市新化區中山路1001號、1001之1號

藥商

南光化學製藥股份有限公司

臺南市新化區全興里中山路1001號、1001-1號