

寬10.7cm X 高18.5cm

“大豐” **硫酸阿託品** 注射液
1毫克／毫升
ATROPINE SULFATE INJECTION
1mg/ml "T. F."

【成 分】

硫酸阿託品注射液乃係美國藥典硫酸阿託品(Atropine Sulfate)之0.1%無色透明的滅菌水溶液。

Each ml contains:

Atropine Sulfate..... 1mg

【賦形劑】

Sodium Chloride, Water for Injection .

【作 用】

硫酸阿託品注射液最初是興奮中樞神經系而後麻痺，又能麻痺副交感神經末梢。瞳孔散大腸蠕動促進眼壓亢進，眼調節機麻痺，血壓亢進，呼吸緩和，腺分泌減少，緩和滑平筋之臟器之痙攣等可奏效。

【適應症】

痙攣、支氣管炎、氣喘、膽石痛。

【用法用量】

本藥限由醫師使用。一次0.2～1ml注射於皮下。

【注意事項】

- 1.禁 忌：青光眼患者，前列腺肥大引起排尿障害之患者，對本劑有過敏之既往歷者禁用本劑。
- 2.前列腺肥大患者，鬱血性心不全患者，潰瘍性大腸炎患者，甲狀腺機能亢進症之患者，嚴重心疾患者須慎重投與本劑。
- 3.副作用：
 - (1)眼：散瞳，調節障害等症狀。
 - (2)消 化 器：口渴、噁心、嘔吐、嚥下障害。
 - (3)泌 尿 器：排尿障害。
 - (4)精神神經系：頭痛、頭重感。
 - (5)呼吸循環器：心悸亢進、呼吸障害。
 - (6)過 敏 症：發疹。
 - (7)顏面潮紅。
- 4.因為胎兒及新生兒會引起頻脈，所以孕婦及授乳婦須慎重投與本劑，另外本劑也會引起乳汁分泌之抑制。
- 5.相互作用：
 - (1)與三環系抗鬱劑，Phenothiazine系藥劑，MAO阻害劑、抗組織胺及 Isoniazide併用會增強本劑之作用。
 - (2)本劑與強心配糖體製劑併用會使強心配糖體製劑之毒性增強，極易產生毛地黃中毒，故併用時應仔細觀察，慎重給藥。
- 6.本劑投與中患者若發生視覺模糊，眩暈或嗜眠，勿從事駕駛或機械操作。

【包 裝】 1ml x 100Amp。

衛署藥製字第 033763 號



GMP藥廠
大豐製藥股份有限公司

公司・工廠：彰化市延平里岸頭巷11號

PANTONE
116 C