



倍樂欣® Baclofen® I.V. solution for infusion

靜脈輸液 5毫克/毫升
5 mg/mL



LOI-004

衛署藥製字第056750號



Fluoroquinolone類藥品可能與肢體障礙及潛在不可逆嚴重不良反應之發生相關，包括肌腱炎、肌腱斷裂、周邊神經炎及中樞神經系統作用。
使用本藥治療下列適應症時，應保留於沒有其他替代治療選擇時：
○ 非複雜性泌尿道感染

1.【醫藥產品名稱】

倍樂欣靜脈輸液 5毫克 / 毫升

2.【定性定量包裝】

包含250毫克Levofloxacin的50毫升小瓶。
包含500毫克Levofloxacin的100毫升小瓶。
完整賦形劑清單請見第6.1節。

3.【藥物形式】

注射液。
淡黃色至黃色澄清液。

4.【臨床特性】 依文獻記載

4.1【治療適應症】

治療成人因對Levofloxacin有感受性的致病菌所引起之下列感染：
社區型肺炎
複雜性泌尿道感染（包括腎盂腎炎）
慢性細菌性前列腺炎
皮膚和軟組織感染
說明：開立Levofloxacin處方前，應考慮國家及 / 或當地適當使用Fluoroquinolones抗生素之準則。

4.2【劑量與施用方法】

本藥限由醫師使用
Levofloxacin注射液每天經由靜脈緩慢注射一或兩次。劑量依據感染類型與嚴重性，及假定致病病原的敏感性而定。通常可以依據患者狀況，在幾天內一開始的靜脈注射治療轉換為口服治療。由於非腸道與口服形式具有生體等效性，可以使用相同的劑量。

治療持續時間

治療持續時間視病情而有差異，如同一般抗生素治療，患者復原或有證據顯示細菌根除後，應持續施用Levofloxacin至少48至72小時。

施用方法

Levofloxacin注射液僅適用於緩慢靜脈注射：每日施用一或兩次。250毫克的注射時間必須至少30分鐘，而500毫克Levofloxacin注射液至少為60分鐘（見第4.4節）。依據患者狀況，可以在一開始施用靜脈注射幾天後，轉換為口服。不相容性請見第6.2節，與其他注射液的相容性請見第6.6節。

劑量

建議施用下列劑量的Levofloxacin：
適切能正常患者的使用劑量（肌酸酐清除率>50 mL/min）

適	應	每日給藥劑量（依據嚴重性）
社區型肺炎	每日給藥劑量	每日兩次500毫克
複雜性泌尿道感染（包括腎盂腎炎）	每日一次250毫克	每日一次250毫克
慢性細菌性前列腺炎	每日一次500毫克	每日一次500毫克
皮膚和軟組織感染	每日兩次500毫克	每日兩次500毫克

嚴重感染案例應考慮增加劑量。

特殊族群

腎功能受損（肌酸酐清除率≤50 mL/min）

給藥方式	250 mg/24 h	500 mg/24 h	500 mg/12 h
肌酸酐清除率	首次劑量：250毫克	首次劑量：500毫克	首次劑量：500毫克
50-20 mL/min	之後：125 mg/24 h	之後：250 mg/24 h	之後：250 mg/12 h
19-10 mL/min	之後：125 mg/48 h	之後：125 mg/24 h	之後：125 mg/12 h
<10 mL/min (包含血液透析 及腹膜透析)	之後：125 mg/48 h	之後：125 mg/24 h	之後：125 mg/24 h

血液透析或腹膜透析(CAPD)後不須使用後續劑量。

肝功能受損
不須調整劑量，因為Levofloxacin並非由肝臟任何部位代謝，主要由腎臟排除。
年長患者
年長患者不須調整劑量，只需考量腎功能（見第4.4節QT間隔延長）。
兒童
Levofloxacin禁用於兒童及生長期青少年（見第4.3節）。

4.3【禁忌症】 依文獻記載

Levofloxacin注射液不得用於：
● 對Levofloxacin或任何其他Quinolone及任何賦形劑過敏的患者，
● 癲癇患者
● 患有施用Fluoroquinolone有關的肌腱病變史的患者，
● 懷孕期間，
● 哺乳女性。

4.4【特別警告與使用注意事項】 依文獻記載

過去使用quinolone或fluoroquinolone類藥品曾發生嚴重不良反應的病人，應避免使用本藥。
觀察到使用levofloxacin兒童患者，比起未使用者更易發生肌肉骨骼疾病（關節痛，關節炎，肌腱和步態異常）之不良反應。動物實驗中在未成年的大量和幼犬，給予口服和靜脈注射之levofloxacin皆曾導致骨軟骨病(osteoecchondrosis) 增加。已知幼年大型關節炎患者，其承受重量的關節(weight-bearing joint)會持續結構病變。其他集喹諾酮類藥物亦會造成未成年動物承受重量的關節軟骨病變及關節病等不良反應。
對於肺炎球菌引起的嚴重肺炎，Levofloxacin可能不是最佳治療方式。
綠線桿菌(P. aeruginosa)引起的院內感染可能需要合併治療。
注射時間
250毫克Levofloxacin注射液的建議注射時間為至少30分鐘，而500毫克為至少60分鐘。已知使用Levofloxacin時，注射期間可能會發展出心跳過快及暫時性血壓降低。在罕見情況下，由於血壓大幅降低，可能發生循環性虛脫。如果懷疑注射Levofloxacin (ofloxacin的異構物) 期間血壓降低，必須立即暫停注射。

梭狀芽孢桿菌(Clostridium difficile)引起的疾病
Levofloxacin注射液治療期間或之後發生的下痢，尤其是嚴重、持續及 / 或出血，可能是梭狀芽孢桿菌引起的疾病症狀，最嚴重的症狀是偽膜性大腸炎(Pseudomembranous colitis)。如果懷疑發生偽膜性大腸炎，應立即停用Levofloxacin注射液，並立即針對患者進行支持性治療（如，口服萬古黴素）。在這種臨床情況下，禁用抑制腸蠕動的藥物。
肌腱炎及肌腱斷裂
罕見情況下可能會發生肌腱炎。最常發生在Achilles tendon，並可能導致肌腱斷裂。在年長患者及使用皮質類固醇的患者身上，肌腱炎及肌腱斷裂的風險會增加。因此如果為這類患者開立Levofloxacin處方，應密切觀察。如果發生肌腱炎症狀，所有患者均應諮詢醫師。如果懷疑發生肌腱炎，必須立即停止Levofloxacin治療，並針對發病的肌腱，開始進行適當的治療。
肌腱炎及肌腱斷裂（好發於阿基里斯腱），有時為雙側，可能在開始使用fluoroquinolone類藥品的48小時內很快發生，也可能甚至在停藥數個月後才發生。老年人，腎功能不良，曾進行器官移植或同時併用皮質類固醇的病人會增加肌腱炎及肌腱斷裂的風險，故使用本藥應避免併用皮質類固醇。
當出現肌腱炎的初期徵兆（如疼痛腫脹、發熱），應停止本藥並考慮使用替代藥物。受到影響的肢體應加以適當的治療（如加以固定）。倘出現肌腱病變的徵兆應避免使用皮質類固醇。

容易發生癲癇的患者
Levofloxacin靜脈輸液和其他Quinolone類藥物一樣，禁用於具有癲癇病史的患者，且用於容易發生癲癇的患者時，應特別小心，例如具有中樞神經病灶的患者，併用Fenbufen與類似的非甾體類抗炎藥物，或降低大腦痙攣閾值的藥物，如茶碱的患者（見第4.5節）。抽搐發作時，應停用Levofloxacin治療。
該α-D-糖醛去氧糖
患有潛在或實質性葡萄糖-6-磷酸去氫酶活性缺失的患者，使用Quinolone抗細菌感染藥物治療時，可能會發生溶血反應，因此使用Levofloxacin時應特別注意。
腎臟受損患者
由於Levofloxacin主要由腎臟排除，應調整腎臟受損患者的Levofloxacin劑量（見第4.2節）。

過敏反應
Levofloxacin可能導致嚴重，甚至致命的過敏反應（如，導致過敏性休克的血管性水腫），有時在初次給藥後就會發生（見第4.8節）。患者應立即停止治療，並聯繫醫師或急診室醫師，醫師會進行適當的緊急醫療處置。
血腫過低
如同所有Quinolone類藥物，曾發生過血腫過低事件，通常在併用口服降血糖藥物（如Glipizamide）或胰島素治療的糖尿病患者身上發生。用於這些糖尿病患者時，建議小心監測血糖。（見第4.8節）。
預防光過敏反應
雖然Levofloxacin引發的光過敏反應很罕見，建議患者應儘量不要接觸強烈日光或人工紫外光（如，白熾燈或日光浴），以避免發生光過敏反應。

使用維他命K拮抗劑治療的患者
由於使用Levofloxacin治療的患者併用維他命K拮抗劑（如Warfarin）時，可能會增加凝血檢測參數(PT/INR)及 / 或出血，同時施用這些藥物時，應進行凝血檢測（見第4.5節）。
精神病反應
服用Quinolone類藥物的患者曾發生過精神病反應，包含Levofloxacin。在極罕見情況下，這些精神病反應會發展出自殺念頭及自殘行為—有時候僅施用一劑

Levofloxacin就會發生（見第4.8節）。患者發展出這些反應時，應停用Levofloxacin並採取適當的措施。如果將Levofloxacin用於精神病患，或具有精神病史的患者，應特別注意。

QT間隔延長

將包含Levofloxacin在內的Fluoroquinolones用於已知有QT間隔延長風險因子的患者時，應特別注意。這些風險因子包含：

- 一先天性QT症候群
- 一併用已知會延長QT間隔的藥物（如，類別IA與III抗心律不整藥物，三環抗憂鬱藥物，巨環黴素等）。
- 一電解質失衡尚未回復（如，血鉀過低症，血鎂過低症）
- 一老年患者
- 一心臟疾病（如心臟衰竭，心肌梗塞，心跳過慢）（見第4.2節年長，第4.5節，第4.8節，第4.9節）。

周邊神經病變

服用Fluoroquinolones（包含Levofloxacin）的患者曾發生過感覺或感覺運動周邊神經病變，其發作可能非常迅速。如果患者發生神經病變症狀，應停用Levofloxacin，以避免發展出不可逆病變。

鴉片類麻醉劑

使用Levofloxacin治療的患者，尿液鴉片類麻醉劑檢測可能會出現偽陽性結果。可能需使用專一性更高的方法，確認陽性藥物篩檢結果。

肝膽管疾病

使用Levofloxacin曾發生過肝臟壞死案例，甚至產生危及生命的肝衰竭，這些案例主要發生在患有潛在嚴重疾病的患者身上，如敗血症（見第4.8節）。如果發展出肝臟疾病徵兆與症狀，如食欲不振、黃疸、尿液暗沉、腹部腫脹或易痛感，應建議患者停止治療並聯繫其醫師。

中樞神經系統作用

(1) 精神相關不良反應
Fluoroquinolone類藥品可能增加精神相關不良反應，包括中毒性精神病、精神病反應進展至自殺念頭/想法、幻覺或妄想；憂鬱或自殘行為如企圖自殺或完成自殺；焦慮、躁動或緊張；精神混亂、譫妄、失去方向感或注意力無法集中；失眠或做惡夢；記憶力受損。這些反應可能發生在第一次投藥後。建議使用本藥之病人倘出現前述不良反應，應立即告知醫療人員，停用此藥並開始適當的治療。
(2) 中樞神經系統不良反應

Fluoroquinolone類藥品可能與增加癲癇（痙攣）風險、增加顱內壓（假性腦腫痛）、顫慄和顫抖有關。此類藥物已知會誘發癲癇或降低癲癇閾值。曾有癲癇重積反應的通報案例。應小心用於癲癇病人及已知或疑似患有可能會誘發癲癇或降低癲癇閾值之中樞神經疾病（如嚴重腦動脈硬化、有癲癇病史、腦部血流減少、腦部結構改變或中風），或其他可能會誘發癲癇或降低癲癇閾值危險因子（如藥物、腎功能不全）的病人。如發生癲癇應停用本藥並開始適當的治療。

血糖異常

Fluoroquinolone類藥品可能與血糖異常有關，包括有症狀的高血糖和低血糖，通常發生於同時使用口服降血糖藥物（如glyburide）或胰島素之糖尿病病人，建議針對這些病人要小小心監控血糖。
曾有嚴重低血糖發作或死亡的通報案例。如使用本藥之病人發生低血糖反應，應停用本藥並立即開始適當的治療。
流行病學研究報告顯示，使用fluoroquinolone類藥品可能增加主動脈瘤及主動脈剝離相關風險，尤其是老年人。

當病人有動脈瘤疾病之家族史，或經診斷已有主動脈瘤及 / 或主動脈剝離，或具有加重主動脈瘤及主動脈剝離之危險因子（如：Marfan syndrome、vascular Ehlers-Danlos syndrome、Takayasu arteritis、giant cell arteritis、Behcet's disease、高血壓、已知有動脈粥樣硬化）時，fluoroquinolone類藥品需經謹慎評估其效益及風險與其他治療方式後方得使用。建議病人如有突發性腰痛、胸或背痛，應立即就醫。

4.5【與其他醫藥產品的交互作用，及其他形式的交互作用】 依文獻記載

其他醫藥產品對於Levofloxacin的影響
Theophylline、Fenbufen或類似的非皮質類固醇發炎藥物
臨床研究中沒有發現到Levofloxacin和Theophylline會產生藥物動力學交互作用，不過Quinolones與Theophylline、非皮質類固醇發炎藥物、或降低痙攣閾值的藥物同時施用時，可能會導致大腦痙攣閾值大幅降低。在Fenbufen存在的情況下，Levofloxacin的濃度大約比單獨施用時高13%。
Probenecid與Cimetidine
Probenecid與Cimetidine在統計上會顯著影響Levofloxacin的排泄。Cimetidine與Probenecid分別會降低Levofloxacin的腎臟排泄率24%與34%。這是因為這兩種藥物都能阻斷Levofloxacin透過腎管分泌。不過，使用研究測試過的劑量時，統計上有顯著的動力學差異，但不太可能產生臨床上的重要影響。同時施用Levofloxacin及影響腎管分泌的物，如Probenecid與Cimetidine時，應特別注意，尤其是在腎臟受損的患者身上時。
其他重要資訊
臨床藥理學研究已經顯示，Levofloxacin與下列藥物同時施用時，其藥物動力學不會受到臨床上的重要影響。碳酸鈣、毛地黃、Glibenclamide、Ranitidine。
Levofloxacin對於其他藥物的影響
Ciclosporin
Ciclosporin與Levofloxacin同時施用時，半衰期會增加33%。
維他命K拮抗劑
併用Levofloxacin與維他命K拮抗劑（如Warfarin）的患者，曾發生凝血檢測參數(PT/INR)及 / 或出血增加的情況，這些情況可能很嚴重。因此，應密切監測使用維他命K拮抗劑治療患者的凝血參數（見第4.4節）。
已知延長QT間隔的藥物
Levofloxacin與其他Fluoroquinolones一樣，用於服用已知延長QT間隔藥物的患者時，應特別小心（如，類別IA與III抗心律不整藥物，三環抗憂鬱劑，巨環黴素）。（見第4.4節QT間隔延長）。

4.6【懷孕與哺乳】 依文獻記載

懷孕
動物生殖研究沒有發生具體的問題。不過在缺乏人類資料，且Fluoroquinolones具有破壞成長生物承重軟骨的可能實驗風險的情況下，Levofloxacin不應用於懷孕女性（見第4.3與5.3節）。
哺乳
在缺乏人類資料，且Fluoroquinolones具有破壞成長生物承重軟骨的可能實驗風險的情況下，Levofloxacin不應用於哺乳女性（見第4.3與5.3節）。
4.7【對於開車與操作機器能力的影響】 依文獻記載
某些不良影響（如嗜睡、嗜睡、視覺模糊）可能影響患者的集中力與反應能力，因此在這些能力特別重要的情況下，可能會造成風險（如，開車或操作機器）。
4.8【副作用】 依文獻記載
下列資訊來自超過5000位患者參與的臨床研究，及上市後的廣泛用藥經驗。不良反應依據下表MedDRA系統器官類別描述。表中列出的頻率定義如下：很常見（≥1/10），常見（≥1/100，<1/10），不常見（≥1/1000，≤1/100），罕見（≥1/10000，≤1/10000），很罕見（≤1/10000），未知（無法依據現有資料推估）。在每個頻率分群中，不良反應依據減滅的嚴重性排序。

- a. 傳染與感染
不常見：真菌感染（及其他具抗真菌性微生物增生）
- b. 血液淋巴系統疾病
不常見：白血球減少，嗜伊紅血球增加(Eosinophilia)
罕見：血小板減少，中性白血球減少
很罕見：粒性白血球缺乏症
未知：各類血球細胞減少，溶血性貧血
- c. 免疫系統疾病
很罕見：過敏性休克（見第4.4節）
過敏性與類過敏性反應有時可能在第一劑後就發生
未知：過敏（見第4.4節）
- d. 代謝與營養疾病
不常見：食欲不振
很罕見：血糖過低，尤其是糖尿病患者（見第4.4節）
- e. 精神疾病
不常見：失眠，神經質
罕見：精神疾病，憂鬱，意識混淆，易怒易怒，焦慮
很罕見：具有自殘行為的精神病反應，包含自殺念頭或行為（見第4.4節），幻覺
- f. 神經系統疾病
不常見：暈眩，頭痛，嗜睡
罕見：抽搐，顫抖，感覺異常
很罕見：感覺或感覺運動周邊神經病變，包含喪失味覺在內的味覺障礙，包含喪失嗅覺在內的嗅覺障礙。
- g. 眼 疾
很罕見：視覺模糊
- h. 耳朵與迷路疾病
不常見：暈眩
很罕見：聽力受損
未知：耳鳴
- i. 心臟疾病
罕見：心跳過快
未知：心電圖QT間隔延長（見第4.4節QT間隔延長及第4.9節）
- j. 血管疾病
常見：靜脈炎
罕見：低血壓
- k. 呼吸、胸部與腸胃病
罕見：支氣管痙攣 呼吸困難
很罕見：過敏性肺炎
- l. 胃腸道疾病
常見：下痢，腹心
不常見：嘔吐，腹部疼痛，消化不良，脹氣，便秘
罕見：極罕見的出血性下痢案例顯示可能患有腸炎，包含偽膜性大腸炎
- m. 肝膽管疾病
常見：肝臟酵素增加（ALT/AST，鹼性磷酸酶，GGT）
不常見：血中膽紅素增加
很罕見：肝炎
未知：使用Levofloxacin的患者曾發生過黃疸與嚴重肝受損，包含急性肝衰竭，主要發生在患有嚴重潛在疾病的患者（見第4.4節）
- n. 皮膚與皮下組織疾病
不常見：出疹，瘙癢症
罕見：毒蕁麻疹
很罕見：血管神經性水腫，光過敏反應

未知：毒性表皮壞死，Stevens-Johnson症候群，多形性紅斑，多汗症黏膜皮膚反應有時候在第一期後就會發生

o. 肌肉骨骼與結締組織疾病

罕見：肌腱病變（見第4.4節），包含肌腱炎（如，阿基里斯腱Achilles tendon），關節痛，肌肉痛

很罕見：肌腱破裂（見第4.4節）。這項不良效果可能在開始治療後48小時發生，並可能兩側同時發生，肌肉虛弱對患有重症肌無力的患者可能特別重要

未知：橫紋肌溶解

p. 腎臟與尿道疾病

不常見：血中肌酸酐增加

很罕見：急性腎衰竭（如，導因於間質性腎炎）

q. 一般疾病與施用部位症狀

常見：注射部位反應

不常見：虛弱

很罕見：發熱

未知：疼痛（包含背部、胸腔及四肢疼痛）

r. 其他與施用Fluoroquinolones類藥物有關的不良作用包含：

- 銻體外症症狀及其他肌肉協調疾病，
- 過敏性血管炎，
- 紫質症患者紫質沉積發作。

4.9【劑量過量】依文獻記載

依據超過治療劑量的動物研究或臨床藥理學研究，最重要的Levofloxacin注射液急性劑量過量徵兆為中樞神經系統症狀，例如精神混亂，暈車，意識模糊，及抽搐性痙攣，QT間隔增加。

劑量過量時，應針對症狀進行治療。應進行心電圖監測，因為可能發生QT間隔延長。血液透析，包含腹部透析與CAPD，不足以將Levofloxacin從身體排除。目前沒有專用的解毒劑。

4.10【警語】依文獻記載

本藥品具有使重症肌無力惡化之風險，具有重症肌無力患者應避免使用。

5.【藥理性質】依文獻記載

5.1【藥物藥效學性質】依文獻記載

藥物治療分類：Quinolones類抗細菌感染藥物，Fluoroquinolones

ATC代碼：J01MA12

Levofloxacin是一類合成Fluoroquinolones類抗細菌感染藥物，是左右旋混合藥物Ofloxacin的(S)-對映異構體。

作用機制

作為一種Fluoroquinolones類抗細菌感染藥物，Levofloxacin作用在DNA-DNA-促旋酶(gyrase)複合體與第四型拓撲異構酶(Topoisoemase IV.)。

PK/PD關連性

Levofloxacin的殺菌活性，與血中最大濃度(Cmax)或曲線下面積(AUC)和最低抑制濃度(MIC)之間的比例有關。

抗藥性產生機制

主要抗藥性機制來自一個gyr-A基因突變。在體外研究中，Levofloxacin與其他Fluoroquinolones之間有交叉抗藥性。

基於其作用機制，Levofloxacin與其他類別的抗細菌感染藥物之間，通常沒有交叉抗藥性。

用藥臨界點

EUCAST將Levofloxacin易感與中度易感菌種分開，中度易感與抗藥性菌種分開，其建議之MIC用藥臨界點列在下面的MIC檢測(mg/L)表中。

EUCAST的Levofloxacin用藥臨界MIC臨界點(2006-06-20)：

病原	易感性	抗藥性
腸桿菌(Enterobacteriaceae)	≤1 mg/L	>2 mg/L
假單胞菌屬(Pseudomonas spp.)	≤1 mg/L	>2 mg/L
不動桿菌屬(Acinetobacter spp.)	≤1 mg/L	>2 mg/L
葡萄球菌屬(Staphylococcus spp.)	≤1 mg/L	>2 mg/L
肺炎鏈球菌(S. pneumoniae) ¹	≤2 mg/L	>2 mg/L
A. B. C. G型鏈球菌	≤1 mg/L	>2 mg/L
感冒嗜血桿菌(H. influenzae)	≤1 mg/L	>1 mg/L
黏膜炎莫氏菌(M. catarrhalis) ²	≤1 mg/L	>1 mg/L
與菌種無關之用藥臨界點 ³	≤1 mg/L	>2 mg/L

1 S/I用藥臨界點≥1.0增加到2.0，以避免將野生種MIC分布分開。該用藥臨界點與高劑量治療有關。

2 MIC數值超過S/I用藥臨界點的菌株很罕見或尚未見諸報告。這些菌種的辨識與抗微生物藥物易感性檢測，必須再度進行，如果確認結果，菌種必須送到參考實驗室。

3 與菌種無關之用藥臨界點，主要依據藥物動力學藥物效力學資料決定，與具體體系的MIC分布無關。這些僅用於還沒有提供菌種專用藥臨界點的菌種，而不用於易感性檢測顯示不建議使用，或證據不足以證實該菌種為良好標的菌種（腸球菌，奈瑟氏菌屬，革蘭氏陰性厭氧菌）

CLSI【臨床與實驗室標準機構，前身為NCCLS】將Levofloxacin易感與中度易感菌種分開，中度易感與抗藥性菌種分開，其建議之MIC用藥臨界點列在下面的MIC檢測(μg/mL)或培養血擴散檢測（使用5μg Levofloxacin培養皿的區域直徑[mm]）表中。

CLSI建議的Levofloxacin MIC與培養血擴散檢測界點(M100-S17, 2007)：

病原	易感性	抗藥性
腸桿菌(Enterobacteriaceae)	≤2 μg/mL ≥17 mm	≥8 μg/mL ≤13 mm
非腸桿菌(Non Enterobacteriaceae)	≤2 μg/mL ≥17 mm	≥8 μg/mL ≤13 mm
不動桿菌屬(Acinetobacter spp.)	≤2 μg/mL ≥17 mm	≥8 μg/mL ≤13 mm
Stenotrophomonas maltophilia	≤2 μg/mL ≥17 mm	≥8 μg/mL ≤13 mm
葡萄球菌屬(Staphylococcus spp.)	≤2 μg/mL ≥17 mm	≥8 μg/mL ≤13 mm
腸球菌屬(Enterococcus spp.)	≤2 μg/mL ≥17 mm	≥8 μg/mL ≤13 mm
感冒嗜血桿菌(H. influenzae)	≤2 μg/mL ≥17 mm	≥8 μg/mL ≤13 mm
肺炎鏈球菌	≤2 μg/mL ≥17 mm	≥8 μg/mL ≤13 mm
Beta溶血性鏈球菌	≤2 μg/mL ≥17 mm	≥8 μg/mL ≤13 mm

1 若抗藥性菌株不存在或罕見，則預先排除《易感性》以外的所有結果類別。

若菌種出現結果顯示屬於《非易感性》類別，應由參考實驗室使用CLSI參照稀釋方法確認菌種辨識與抗微生物藥物易感性檢測結果。

抗菌範圍

特定菌種不同地區時間的抗藥性發生率可能有差異，最好能取得當地抗藥性資訊，尤其是治療嚴重感染的時候。在當地抗藥性發生率達到將藥物用於至少某些類型感染的效果存疑時，應視需要尋求專家建議。

常見易感性菌種

好氧革蘭氏陽性菌

甲氧苯青黴素(Methicillin)有效之金黃色葡萄球菌^a

腐生性葡萄球菌(Staphylococcus saprophyticus)

C型及G型鏈球菌

無乳鏈球菌(Streptococcus agalactiae)

肺炎鏈球菌^a

化膿性鏈球菌(Streptococcus pyogenes)^a

好氧性革蘭氏陰性菌

Burkholderia cepacia \$

腐敗及腐氏菌(Eikenella corrodens)

感冒嗜血桿菌(Haemophilus influenzae)^a

副流感嗜血桿菌(Haemophilus para-influenzae)^a

產酸克雷伯氏菌(Klebsiella oxytoca)

肺炎克雷伯氏菌(Klebsiella pneumoniae)^a

Moraxella catarrhalis^a

巴斯德桿菌(Pasteurella multocida)

普通變形桿菌(Proteus vulgaris)

Providencia rettgeri

厭氧菌

消化鏈球菌屬(Peptostreptococcus)

其他

肺炎披衣菌(Chlamydia pneumoniae)^a

肺炎熱披衣菌(Chlamydia psittaci)

砂眼披衣菌(Chlamydia trachomatis)

肺炎退伍軍人桿菌(Legionella pneumophila)^a

肺炎微漿菌(Mycoplasma pneumoniae)^a

人型微漿菌(Mycoplasma hominis)

腐溶性尿漿菌(Ureaplasma urealyticum)

獲得抗藥性後可能造成問題的菌種

好氧革蘭氏陽性菌

糞腸球菌(Enterococcus faecalis)^a

具甲氧苯青黴素抗藥性之金黃色葡萄球菌

凝固酶陰性之葡萄球菌屬

好氧性革蘭氏陰性菌

鮑氏不動桿菌(Acinetobacter baumannii)^a

弗氏檸檬桿菌(Citrobacter freundii)^a

產氣桿菌(Enterobacter aerogenes)

Enterobacter agglomerans

陰溝腸桿菌(Enterobacter cloacae)^a

大腸桿菌(Escherichia coli)^a

Morganella morganii^a

奇異變形桿菌(Proteus mirabilis)^a

Providencia stuartii

綠膿桿菌(Pseudomonas aeruginosa)^a

沙雷氏黏質菌(Serratia marcescens)^a

厭氧菌

脆弱桿菌(Bacteroides fragilis)

卵形類桿菌(Bacteroides ovatus)^a

多形類桿菌(Bacteroides thetaiotamicron)^a

普通類桿菌(Bacteroides vulgatus)^a

芽孢桿菌(Clostridium difficile)^a

^a 經證實核可臨床適應症中，對易感性菌種有臨床藥效。

\$ 天然的中度易感性

其他資訊

綠膿桿菌(P. aeruginosa)引起的院內感染可能需要合併治療。

5.2【藥物動力學性質】依文獻記載

吸收

口服施用Levofloxacin會迅速並幾乎完全吸收，1小時內達到最高血中濃度。對生體利用率幾乎為100%。

食物對Levofloxacin吸收的影響很小。

分布

大約30-40%的Levofloxacin與血中蛋白質結合。每日一次500毫克Levofloxacin多次給藥後，藥量累積可以忽略不計。每日兩次500毫克給藥後，Levofloxacin出現中度但可預測的藥量累積情形。3天內會達到穩定狀態。

穿透進入組織與體腔

穿透進入呼吸管黏膜，上皮內襯液體(Epithelial Lining Fluid, ELF)

支氣管黏膜與上皮內襯液體經過

口服500毫克後的最大Levofloxacin濃度分別為8.3 μg/g與10.8 μg/mL。這些大約會在施用後一小時達到。

穿透進入肺組織

口服500毫克Levofloxacin後，肺組織的最大Levofloxacin濃度大約為11.3 μg/g，在施用後4到6小時之間達到。肺部濃度持續超過血中濃度。

穿透進入氣泡液體

每日給藥一次或兩次500毫克，給藥三天，施用後2-4小時，水泡液體中的最大Levofloxacin濃度大約分別為4.0與6.7 μg/mL。

穿透進入腦脊髓液

Levofloxacin穿透到腦脊髓液的能力很差。

穿透進入前列腺組織

每日口服施用一次500毫克Levofloxacin三天後，施用2小時，6小時，及24小時後，前列腺組織的平均濃度為8.7 μg/g，8.2 μg/g與2.0 μg/g；平均前列腺/血中濃度比為1.8。

尿液中的濃度

單次口服施用150毫克，300毫克或500毫克Levofloxacin 8-12小時後，平均尿液中濃度分別為44 mg/L，91 mg/L與200 mg/L。

生體轉換

Levofloxacin被代謝的比例很低，代謝物為Desmethyl-Levofloxacin與Levofloxacin N-oxide。這些代謝物佔尿液排出劑量的5%以下。Levofloxacin的立體化學性質穩定，不會進行鏡像異構物轉換。

排泄

口服與靜脈施用Levofloxacin後，會以相對較慢的速率從血中排出（t_{1/2}：6-8小時）。主要經由腎臟途徑排泄（>85%的施用劑量）。

靜脈注射與口服施用Levofloxacin後，藥物動力學沒有重大差異，顯示口服與靜脈注射給藥方式可以互換。

線性

Levofloxacin在50到600毫克劑量範圍內，遵循線性藥物動力學。

腎功能不足患者

Levofloxacin的藥物動力學可能會受到腎功能不足的影響。腎功能下降時，腎臟的排出與清除量會下降，而排除半衰期會如下表所示增加。

CL _r (mL/min)	<20	20-40	50-80
CL _k (mL/min)	13	26	57
t _{1/2} (小時)	35	27	9

不良反應

年輕與老年受試者的Levofloxacin藥物動力學沒有顯著差異，與肌酸酐清除率有關的參數除外。

性別差異

男性與女性受試者的獨立分析顯示，Levofloxacin藥物動力學有很小到最低限度的性別差異。沒有證據顯示這些性別差異在臨床上有何重要性。

5.3【臨床前安全性資料】依文獻記載

急性毒性

小鼠與大鼠靜脈注射施用Levofloxacin的中位致死劑量(LD50)數值介於250-400 mg/kg；狗的LD50數值大約為200 mg/kg，接受這個劑量的動物有一半會死亡。

重複給藥毒性

在大鼠(20, 60, 180 mg/kg/day)與猴子(10, 25, 63 mg/kg/day)進行過靜脈注射施用一個月研究，而大鼠進行過二個月研究(10, 30, 90 mg/kg/day)。大鼠研究中，一個月與二個月沒有觀察到不良事件的濃度(NOEL)分別為20與30 mg/kg/day。兩組研究在劑量20 mg/kg/day及更高時，尿液中都觀察到結晶狀殘留物。高劑量（一個月研究中180 mg/kg/day或三個月研究中30 mg/kg/day及更高）會略微降低食物消耗量與體重。血液檢查顯示1個月結束時，紅血球減少而白血球及網狀血球增加，但是3個月研究沒有變化。猴子研究中的NOEL為63 mg/kg/day，這個劑量時，只會略微降低食物與飲水消耗量。

生殖系統毒性

口服劑量高達360 mg/kg/day，或靜脈注射劑量高達100 mg/kg/day的Levofloxacin，不會導致大鼠的生育力或生殖能力受到影響。

口服劑量高達810 mg/kg/day，或靜脈注射高達160 mg/kg/day，不會對大量造成畸胎影響。兔子口服高達50 mg/kg/day或靜脈注射高達25 mg/kg/day時，沒有觀察到致畸胎性質。Levofloxacin對生育力沒有影響，而對於胚胎的唯一影響是生長遲緩，這是母體毒性造成的結果。

基因毒性

Levofloxacin不會對細菌或哺乳類細胞造成基因毒性，但是在100 μg/mL或更高濃度時，會在沒有經過代謝活化的情形下，誘發體外的中國倉鼠肺細胞(CHL)產生染色體異常。體內試驗（微核，姐妹染色體交換，未排定DNA合成，顯性致命試驗）沒有發現任何致基因毒性能力。

光毒性能力

小鼠靜脈注射及口服研究顯示，Levofloxacin只在很高劑量具有光毒性活性。Levofloxacin在光致突變檢測中，沒有觀察到任何基因毒性，且在光致癌性檢測中，減緩腫瘤的發展。

致癌可能性

老鼠飲食施用兩年的研究中，沒有發現任何致癌可能性(0, 10, 30 and 100 mg/kg/day)。

對關聯的毒性

如同其他Fluoroquinolones類，Levofloxacin對於大鼠與狗的軟骨有影響（出現氣泡與空腔）。這些結果在幼年動物中較明顯。

6.【藥物組品】

6.1【賦形劑清單】

Sodium Chloride Hydrochloric Acid Water For Injection。

6.2【不相容性】

Levofloxacin 5 mg/mL注射液不應與肝素或鹼性溶液混合（如碳酸氫鈉）。除了第6.6節所列產品外，本藥品不得與其他藥品混合。

6.3【保存期限】

移除外包裝後保存期限：3天（室內照下）。

機膠塞子穿孔後保存期限：立即使用（見第6.6節）

從微生物學觀點來看，注射液應立即使用。如果沒有立即使用，使用中儲存時間與條件為使用者應承擔之責任。

6.4【儲存特殊注意事項】

將瓶子放在外盒中，以防止光照（見第6.3節）。使用前先檢查外觀。只應使用不含顆粒的清澈溶液。25℃以下儲存。

6.5【包裝】

50毫升、100毫升小瓶，100支以下盒裝。

6.6【棄置特殊注意事項】

Levofloxacin注射液應在機膠塞子穿孔後立即使用（3小時內），以避免任何細菌污染。注射時不須避光照。

如同所有藥物，任何未使用的藥品應依據並符合當地環保法規棄置。

與其他注射液混合使用

Levofloxacin注射液與下列注射液相容：

0.9%氯化鈉溶液USP。

5%葡萄糖注射液USP。

含2.5%葡萄糖的林格氏液。

不相容性請參見第6.2節。



永信藥品工業股份有限公司
YUNG SHIN PHARMACEUTICAL IND. CO., LTD.
公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號
電話：(04) 26875100
台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號