

"南光"氰鈷胺明注射液 1 0 0 0 微克/毫升

CYANOCOBALAMIN INJECTION 1000MCG/ML "N.K."

內衛藥製字 第 006650 號

限由醫師使用

版本日期 2025-06-12

1 性狀

氰鈷胺明又名維他命B12，於1948年經Rickes Smith 從動物肝臟中分離出一種含有抗貧血成分之赤色結晶。而於1955年經A.Todd決定其構造式，其分子式為 $C_{63}H_{88}O_{14}N_{14}PCo$ ，其分子量高達1355.42，其構造式亦甚複雜，中間一個鈷原子為四個Pyrrole 核所包圍。

1.1 有效成分及含量

Each mL contains:

Cyanocobalamin.....1000 mcg

本藥品活性成分中含有鈷

1.2 賦形劑

Sodium Chloride、Citric acid Anhydrous、Benzyl Alcohol、Hydrochloric acid、Sodium hydroxide、Water for Injection。

1.3 劑型

注射劑

1.4 藥品外觀

澄清紅色溶液

2 適應症

惡性貧血症，出血性貧血、具有神經合併症之惡性貧血、巨紅血球性貧血、巨胚紅血球性貧血、維他命B₁₂ 缺乏症。

3 用法及用量

通常成人一回10-2000mcg分1-3次注射於皮下或肌肉或靜脈注射。

3.1 用法用量

通常成人一回10-2000mcg分1-3次注射於皮下或肌肉或靜脈注射。


4 禁忌

已知對維生素 B12 或本藥品所含之賦形劑發生嚴重過敏者。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

5.1.2 本藥品含有鈷，若已知本身對鈷過敏，請告知醫療人員。



5.1.3 曾有鈷過敏病人使用本藥品後發生過敏性接觸皮膚炎之情形。

交互作用

目前尚無資訊

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

8.1.1 皮膚及皮下組織異常：上市後曾接獲使用本藥品後出現皮膚疹、搔癢、痊瘡樣皮疹、血管性水腫、皮膚炎、多型性紅斑等不良反應。

8.1.2 免疫系統的異常：上市後曾接獲使用本藥品後出現嚴重過敏反應或過敏性休克不良反應。

9 過量

目前尚無資訊

10 藥理特性

10.1 作用機轉

目前尚無資訊

10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊

13 包裝及儲存

13.1 包裝

1、5、10毫升棕色玻璃安瓿裝，1000支以下盒裝。

13.2 效期

如外包裝所示。


13.3 儲存條件

本品應於25°C以下儲存

15 其他

版次：020525-04

114.06.12



製造廠

南光化學製藥股份有限公司

藥商

南光化學製藥股份有限公司

臺南市新化區全興里中山路1001號、1001-1號

臺南市新化區全興里中山路1001號、1001-1號