

"生達" 力佳爽 注射液

Dexamethasone Injection

力佳爽注射液(Dexamethasone injection)為有效成分Dexamethasone-21-Phosphate Disodium之水溶液。

成分：每ml含：

Dexamethasone-21-Phosphate Disodium.....5mg

適應症：傷風質斯性關節炎、散播性之紅斑性狼瘡、結節性動脈周圍炎、皮膚炎、支氣管氣喘、滑液囊炎、腱炎、關節周圍炎、濕疹、天疱瘡、火傷、手術時之休克。

用法用量：全身療法通常每日一針5mg(1ml)即夠，對於一些休克每日需5mg二針至三針之靜脈注射。

對於關節周圍疾患，通常一次注射1~1.5ml為原則，鞘內注射則宜用0.5~1.5ml(2.5~7.5mg)必要時可重複治療，經本劑治療時，患者應改用口服療法(如力佳爽錠)以逐漸減少劑量，本藥限由醫師使用。

- 注意事項：**
1. 急慢性感染症使用時，請同時併用適當的化學療法劑，或抗生素藥品以治療感染疾病。
 2. 對消化管障害如胃腸潰瘍務請特別注意。
 3. 因主要副作用引起浮腫，血壓上升是以腎臟疾患及高血壓患者應注意。
 4. 糖尿病患者使用時有增加Insulin藥量之必要。
 5. 對於有精神病因素者多加注意。
 6. 使用本劑期間請充分補充蛋白質。
 7. 曾有文獻報導於硬脊膜外注射(epidural administration)給予皮質類固醇後發生罕見但嚴重的神經系統不良反應，包括視力喪失、中風、癱瘓、死亡等，多數個案發生於懸浮或緩釋劑型之皮質類固醇類注射劑成分藥品
 8. 本產品含有防腐劑成分，不應以椎管內(intracanal) 或硬脊膜外(epidural) 注射給藥

絕對禁忌：精神病、消化管潰瘍、抗生物質不能奏效之須要手術之感染性疾患。心臟血管障害、腎臟機能不全、糖尿病、閉塞性靜脈炎、骨疏鬆病、痙攣性疾患、結核。

賦形劑內容：Sodium sulfite、Creatinine、Sodium citrate、Sodium chloride、Methyl paraben、Propyl paraben、Water for injection、Ethylene diamine tetraacetate disodium、Sodium hydroxide、Hydrochloric acid

貯存條件：請儲存於25°C以下陰涼處。

包裝：1、2、10毫升100支以下小瓶，1毫升100支以下安瓿，1毫升120支安瓿。

衛署藥製字第003881號 Code No. ID-01 2213130



PIC/S GMP 藥廠
生達化學製藥股份有限公司
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.
台南市新營區土庫里土庫6之20號