

“台裕” 鹽酸二苯胺明 注射液

Diphenhydramine HCl Injection “Tai Yu”

【成分】

Each ml contains:

Diphenhydramine HCl30mg

【適應症】

皮膚疾患(濕疹、皮膚炎)枯草熱、過敏性鼻炎、急性鼻炎、血管神經性鼻炎。

【用法用量】依文獻記載

- (1). 成人一日 2~3 次，每次 1ml (30mg)，皮下或肌肉注射，但必要時亦可靜脈注射。
- (2). 本品以靜脈注射時，每次 diphenhydramine 之劑量以 10mg-50mg 為宜，且其注射速率不宜超過 25mg/min。
- (3). 兒童不宜使用本品。
- (4). 早產兒(premature infants)及新生兒(neonate)不建議使用。
- (5). 老人宜以最低有效起始劑量開始治療。
- (6). 腎功能不全者應延長給藥間隔(interval)；輕度(GFR>50mL/min)：間隔 6 小時；中度(GFR 10-50mL/min)：間隔 6-12 小時；重度(GFR<10mL/min)：間隔 12-18 小時。
- (7). 本藥限由醫師使用。

【注意事項】依文獻記載

- (1). 本品有嗜睡催眠之作用，故凡投予本品之患者，不宜從事機械之操作或開汽車、摩托車及自行車等，以免發生意外事件。
- (2). 本品有下列之副作用：
 - (a). 精神神經系倦怠感、神經過敏、頭痛、口渴等。
 - (b). 消化系-噁心、嘔吐、下痢等症狀之出現。
- (3). 妊婦或有妊娠可能性之婦女，使用本品時，應特別慎重。
- (4). 注射時患者身體部位之選擇及注意：
 - (a). 肌肉注射時盡量避免傷及神經組織。
 - (b). 神經分佈區域避免注射。

【賦形劑】

Benzyl Alcohol 、 Water for Injection 。

【貯存條件】

25°C以下密封貯存。

【包裝】

1 毫升玻璃安瓿裝，100 支以下盒裝。



台裕化學製藥廠股份有限公司

TAI YU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

新竹縣竹東鎮員山路 11 巷 13 弄 1 號

TEL：(03)5826655

FAX：(03)5822389