

Forteo 病人衛教 check list

準備物品

- ◆ 衛教包 (含說明書、衛教**同意書**) → 「同意書」撕下收回, 「告知聲明」需還病人
- ◆ Forteo 注射筆 Sample、針頭 * 1
- ◆ 酒精棉片 * 2
- ◆ 保冰袋(美沙冬那側桌面底下)、冰寶(冷藏冰箱最底層)

前置作業

◆ 填寫衛教**同意書**

- 同意即表示願意將個人資料提供給骨穩中心, 但可隨時撥打服務專線要求從連絡名單中除名。
- 同意衛教可獲贈**保冰袋**。(藍色保冰袋裡面應該要有附冰寶, 拿出來跟冷藏冰箱底層的冰寶交換)

◆(1130827 新增)總結: 其實有拿保冰袋就需要寫同意書(有獲贈東西)

- 健保病人: 獲得保冰袋、每月電話關懷衛教
- 自費病人: 獲得保冰袋、每月電話關懷衛教、Forteo 買三送一(持醫院收據至合作院所領取)

衛教流程 - 重點提示

①衛教包裡最大張的衛教單:

- ◆ 衛教單正面: 注射筆圖解 - 注射筆需冷藏, 不可冷凍。若藥物結冰則不可再使用。
- ◆ 衛教單內頁: 注射筆使用說明, 請逐步操作講解
 - 操作者使用前需先清潔雙手。
 - 酒精棉片 1 片消毒病人注射部位, 1 片消毒注射筆底端紅色橡皮塞。
 - 施打部位: 建議**腹部**輪流施打即可 (即圖上紅色 A、B 兩處), 因大腿部位通常較不順手。
 - 使用過的針頭以塑膠桶收集後帶回醫院回收。
- ◆ 衛教單背面: 病人常有疑問, 逐項說明
 - 第 3 點: 一支骨穩可使用 28 天, 之後黑色注射鈕即無法拉開(此時藥筒內仍可能有少量液體)。

②說明書 - 第 5 頁: 正確握筆方式。

- 第 11 頁: 如何**重設骨穩**, 請務必詳細說明。
- 第 26~37 頁: 注射紀錄表 - 可請病人每日記錄注射部位 (如: 右上 1、左下 3)。
- 第 38~43 頁: 注射筆使用紀錄表 - 請病人填上開始使用日期。
- 其餘詳細問答可請病人自行閱讀。

其他提醒

- ◆ 若有任何問題 (如: 忘記冷藏、注射筆有異常...), 皆可請病人撥打 0800 專線詢問。
- ◆ 若需再次衛教, 可撥打 0800 專線提出到府完整衛教之需求。
- ◆ 若藥師無法當場衛教, 可請病人完整填寫兩張同意書後, 我們會把資料提供給業務並安排衛教。
- ◆ **骨穩買三送一申請流程**(1140414 補充說明)
 1. 填寫同意書加入骨穩骨鬆關懷小組

2. 請妥善保存收據(建議拍照留存電子檔，若收據遺失需再向醫院申請)
3. 累積於醫院購買三支後，至超商傳真收據(傳真專線:02-87728782)
4. 傳真後致電 0800-889-900(周一至周五)，確認是否收到傳真
5. 等候專人與您聯繫(約 1-3 個工作天)，於指定時間地點領取藥品(通常為家中附近有簽約的特約藥局)

*若有疑問，可留病人資訊(姓名、電話)給裕利負責人：0905717787 廖家萱 Sandy

*等於前 3 支在醫院購買，都買完了第 4 支則向公司免費申請

*第 4 支 Forteo 因沒有配給針頭，建議針頭可在前 3 支時於醫院門診多開立

修正說明及補充(112.08.23)

- ◆ 刪除「贈送鈣片」活動
- ◆ 刪除「P1NP 檢測同意書」：目前是否檢測 P1NP 由醫師及病人決定
- ◆ 如病人符合健保給付規定，不用自費購買 Forteo，廠商仍希望能填寫同意書，方便計算保冰袋數量
- ◆ 目前最新給付規定如下(113.08.27)：

5.6.2. Parathyroid hormones and analogues (副甲狀腺素及類似劑)： teriparatide 注射劑(101/7/1、110/5/1)

限用於

1. 停經後骨質疏鬆婦女。
 2. 原發性或次發於性腺功能低下症造成骨質疏鬆之男性。
 3. 需符合下列條件：
 - (1)引起脊椎或髖部多於2 (含)處骨折，經評估(須於病歷載明)無法耐受副作用或在持續配合使用抗骨質吸收劑至少連續12個月的情況下仍發生至少1處新的骨折之病患。
 - (2)骨質疏鬆之程度，須經 DXA 檢測 BMD 之 T-score 小於或等於-3.0。
 4. 使用不得超過18支並於二年內使用完畢，使用期間內不得併用其他骨質疏鬆症治療藥物。
 5. 與 romosozumab 僅得擇一使用，除因耐受性不良，不得互換。(110/5/1)
- 備註 DXA: Dual energy X-ray absorptiometry
BMD: Bone mineral density

1120829 業代筆記：

1. Forteo 大概在第 9 個月 maybe 才會有明顯效果
2. 目前 FDA 跟臺灣都改掉最多使用 2 年的限制，高度骨折風險等病人可使用超過 2 年

1130829 可於室溫存放 36 小時 Ref. <https://forteo.lilly.com/taking-forteo>



[Prescribing Information](#)
[Instructions for Use](#)
[Medication Guide](#)

refrigerated between 36 and 46 degrees Fahrenheit when you are not traveling.
7. Only keep FORTEO out of the refrigerator while you're traveling. Otherwise, keep refrigerated whenever possible.

Preparing to travel with FORTEO

For daily use, FORTEO should be refrigerated. When traveling and refrigeration is unavailable, the FORTEO delivery device can remain at room temperature conditions (77°F [25°C]) for up to a total of 36 hours per device. Pack the needles you'll need for your trip. Keep FORTEO with you when traveling to prevent it from being damaged, lost, or exposed to extreme temperatures. Do not put FORTEO in the trunk of a car or in checked baggage. Refrigerate FORTEO as soon as you arrive at your destination.