

"南光"吉多士注射液 5%

Gitose Injection 5% "N.K."

衛署藥製字第 029835 號

「成份」:Each ml contains:

Dextrose Monohydrate

50mg

「適應症」:

急性傳染病患之水份補給，體液之增量。

「用法用量」:

本藥限由醫師使用。

通常每次 500ml 靜脈點滴注射，但可依年齡及症狀酌予增加。

「注意事項」:

一、取用時:

1.運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。

2.若藥液有不澄清、變色、異物或其他異常現象時，請勿使用。

二、輸液套選用及插入法:

1.請依輸液套使用方法正確使用。

2.請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。

3.使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

「儲藏」:

本品應存放於陰涼處所。

「包裝」:

20，100，250，500，1000 公撮玻璃瓶、塑膠瓶、塑膠軟袋裝，100 支以下盒裝。



南光化學製藥股份有限公司
台灣 台南縣新化鎮中山路1001號
TEL:06-5984121(代表) FAX:
06-5972033