

“南光” 吉多士 注射液 5 %  
10 %

5 %  
Gitose Injection 10% "N.K."

■成分：Each ml contains:

Dextrose Monohydrate .....50 mg

Dextrose Monohydrate .....100 mg

■適應症：急性傳染病患之水分補給、體液之增量。

■用法用量：本藥限由醫師使用。

通常每次500 ml靜脈點滴注射，但可依年齡及症狀酌予增減。

■注意事項：

一、取用時：

- 1.運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。
- 2.若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

二、輸液套選用及插入法：

- 1.請依輸液套使用方法正確使用。
- 2.請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。
- 3.使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

■儲藏：本品應存放於陰涼處所。

■包裝：20，100，250，500，1000公撮玻璃瓶、塑膠瓶、塑膠軟袋裝，  
100支以下盒裝。

5 % --- 衛署藥製字第 029835 號

10 % --- 衛署藥製字第 029838 號



南光化學製藥股份有限公司

台灣·台南縣新化鎮中山路1001號

TEL: (06)5984121(代表) FAX: (06)5981845