

曾在腎上腺皮質類固醇治療後觀察到丙胺酸轉胺酶(ALT，SGPT)、天門冬胺酸轉胺酶(AST，SGOT)和鹼性磷酸酶上升。這些變化通常不大，停藥後可逆轉。

皮膚方面

- 傷口癒合不易。
- 紫點和瘀斑。
- 皮膚變薄脆弱。
- 曾有病患接受腎上腺皮質類固醇療法產生 Kaposi 氏瘤的病例報告。

代謝方面

由於蛋白質代謝引起之負氮平衡。

神經方面

- 腦內壓增加。
- 大腦假性腦瘤。
- 精神錯亂/精神疾病症狀，包括欣快、失眠、情緒不穩、性格改變和憂鬱、已存在之情緒不穩或精神病傾向惡化。
- 痙攣。

內分泌方面

- 月經不規則。
- 形成類 Cushing 症。
- 腦垂體—腎上腺皮質軸之抑制。
- 碳水化合物耐受性降低。
- 突顯潛在性糖尿病。
- 糖尿病病人對胰島素或口服降血糖劑的需求增加。
- 抑制兒童的成長。

眼睛方面

- 後囊下白內障。
- 增加眼內壓。
- 眼球凸出。

免疫方面

- 遮蔽性感染。
- 潛在性感染變成活動性，包括結核病再度活化。
- 任何病原在身體任何部位之機會感染，輕微至致死症狀均有。
- 過敏反應，包括過敏性休克和類過敏反應(例如支氣管痙攣、咽喉水腫、蕁麻疹)。
- 可能抑制皮膚試驗的反應。

其他

Act-O-Vial 的包裝含苯甲醇，已知與未成熟嬰兒的致死性「喘息症候群」有關。

交互作用

誘導肝臟酵素的藥物，例如 phenobarbital、phenytoin 和 rifampin，可能會增加腎上腺皮質類固醇 clearance，需要增加腎上腺皮質類固醇劑量，以達到預期的治療反應。Troleandomycin 和 ketoconazole 類藥物，會抑制腎上腺皮質類固醇代謝，進而降低其 clearance。因此，應調整腎上腺皮質類固醇劑量，以避免類固醇毒性。腎上腺皮質類固醇會增加慢性高劑量 aspirin 的 clearance。這會導致血清中水楊酸鹽含量降低，或在停用腎上腺皮質類固醇時增加水楊酸鹽毒性風險。低凝血酶原血症病人併用腎上腺皮質類固醇和 aspirin 時，應小心使用 aspirin。腎上腺皮質類固醇對口服抗凝血劑的影響各有差異。目前有併用腎上腺皮質類固醇時會增加及減少抗凝血劑效應的報告。因此，應監控凝血指標，以維持預期的抗凝血效應。

用法用量：本藥限由醫師使用

本品可供靜脈注射、靜脈輸注，或肌肉注射，緊急狀況初期最好使用靜脈注射，之後考慮使用較長效的注射劑或口服製劑。開始治療時於 30 秒(例如相當於 100 mg hydrocortisone 之 hydrocortisone sodium succinate)到十分鐘(例如 500 mg 或更多量時)以靜脈投予治療。一般，高劑量的腎上腺皮質類固醇療法應維持到病人穩定;通常不超過 48 到 72 小時。雖然高劑量，短期之類皮質素治療引起之副作用不常見，但仍可能發生消化性潰瘍，可先使用制酸劑預防之。當高劑量 hydrocortisone 治療必須持續 48 至 72 小時，可能會發生高血鈉症。在此狀況下使用極少或不會引起鈉滯留的類皮質酮，如 methylprednisolone sodium succinate 代替 hydrocortisone sodium succinate 可能較令人滿意。起始劑量為 100 mg 到 500 mg 或更大量(hydrocortisone 相當於 hydrocortisone sodium succinate)，視病情的嚴重程度而定。可依病人反應及臨床狀況每隔 2，4 或 6 小時重複給藥。嬰兒及兒童的劑量可能須減少，但應視病情的嚴重程度和病人反應決定劑量，而非由年齡或體重決定之，每天劑量不應低於 25 mg，最大劑量為 15 mg/kg。病人重創使用皮質類固醇治療後應密切注意其是否有腎上腺皮質功能不足的徵兆和症狀。類皮質素為一輔助療法，而非取代傳統療法。

溶液的配製

當注射前應儘可能檢視注射產品是否有異物和污點。

100 毫克小瓶--靜脈或肌肉注射時，以無菌操作將至多 2 ml 含或不含制菌劑之 注射用水或氯化鈉注射液加入瓶內。靜脈輸注時，先以至多 2 ml 之含或不含制菌劑注射用水或氯化鈉注射液加入小瓶內，再將此溶液加入 100-1000 ml 5% dextrose in water (若病人如無須限鈉，也可使用等張生理食鹽水或 5% dextrose 之生理食鹽水)。

儲存

未配製之產品：存放於 25°C。

【外觀、使用方法及包裝】

舒爾體爽注射劑小瓶裝含冷凍乾燥之 hydrocortisone sodium succinate。靜脈和肌肉注射投予。

【包裝】

100 毫克安瓿裝及玻璃小瓶裝，100 支以下盒裝。

賦形劑：Sodium phosphate monobasic dihydrate、Dibasic sodium phosphate hydrate、Water for Injection

反面



委託者

中化裕民健康事業股份有限公司

Chungghwa Yuming Healthcare Co., Ltd.

總公司：臺北市中正區義陽路23號8樓



製造廠

中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口182-1號 ®