

公告

編號：1051204

新進藥品

藥品英文名	Invega Sustenna		
藥品中文名	善思達持續性藥效肌肉注射懸浮劑		
主成分名	Paliperidone150mg/1.5ml		
藥品代碼	13P090	廠牌 / 代理商	JANSSEN
衛生署核准適應症	治療精神分裂症		
用法用量	投與劑量視個別病患的耐受性及(或)療效而定，範圍為 39 至 234 毫克 (paliperidone25-150mgeq.)，建議於治療的第一天、第八天(即一週後)投與於手臂三角肌，之後每月一次的維持劑量可注射於手臂三角肌或臀部肌肉。可每月調整一次維持劑量。 遺漏劑量： 避免遺漏劑量 Invega Sustenna 的第二劑起始劑量建議應於第一劑的一週之後投予。為避免遺漏劑量，可於一週時間點(one-week time point)的前後 2 天內為患者注射第二劑。同樣地，起始療程之後的第三劑及後續的注射劑量都建議以每月一次的方式給藥。為避免遺漏每月一次的劑量，可於每月一次之時間點的前後 7 天內為患者注射藥物。 遺漏劑量(1 個月至 6 週)： 在起始療程之後 Invega Sustenn 的建議注射週期為每月一次。如果距離上次注射所經過的時間還不到 6 週，則應儘快投予先前所使用的穩定劑量，然後每隔一個月注射一次。 遺漏劑量(>6 週至 6 個月)： 如果距離上次注射 Invega Sustenn 所經過的時間已超過 6 週，則應依照下列方式重新開始使用患者先前所使用的穩定劑量(但若患者先前所使用的穩定劑量為 234 毫克，則最初兩次注射的劑量應為 156 毫克)： 1)儘快在三角肌位置注射一劑， 2)一週後於三角肌位置再注射一劑(相同的劑量)，然後 3)重新開始每隔一個月於三角肌或臀部肌肉注射一劑。 遺漏劑量(>6 個月)： 如果距離上次注射 Invega Sustenn 所經過的時間已超過 6 個月，則重新開始投藥。		
可能的副作用	心跳加快，體重增加，腸胃不適，困倦。		
用藥注意事項	對從未使用過口服用 paliperidone 或口服用或注射用之 risperidone 的患者，建議在開始使用 Invega Sustenn 治療之前先確認其對口服用 paliperidone 或口服用 risperidone 的耐受性。在臨床試驗中，這類病患需先接受 4 天 paliperidoneER3mg/day 以確認耐受度良好才開始使用 Invega Sustenn。		
特殊使用注意事項	本院目前有兩種劑量：Invega Sustenna 150mg/1.5ml 及 100mg/ml		

藥品圖樣



藥劑部藥管組 105.12.13