

“台裕”

乳酸林格氏注射液

Lactated Ringer's Injection “TAI YU”



衛署藥字第 044548 號

「“台裕”乳酸林格氏注射液」為 Sodium Lactate 及 Ringer's Solution 之注射液。Ringer's Solution 可補充人體所需之電解質。Sodium Lactate 主要於肝臟被氧化成 Bicarbonate，而此氧化過程會消耗體液中之氫離子，故可用於代謝性酸中毒。

成分

Each ml contains:

Sodium Chloride	6.0	mg
Potassium Chloride	0.3	mg
Calcium Chloride Dihydrate	0.2	mg
Sodium Lactate	3.1	mg
Water for Injection added to make	1.0	ml
電解質(mEq/L)：Na ⁺ 130，K ⁺ 4，Ca ⁺⁺ 3，Cl ⁻ 109，lactate 28		
pH：6.0~7.5 滲透壓比：0.8~1.0		

90.10.08



本藥含 chloride 及 lactate，比生理食鹽液或林格氏液更近似於細胞外液之組成，除可當電解質補充液外，所含之 sodium lactate 在體內被代謝為等當量之 sodium bicarbonate，故亦能對體液發揮緩衝作用。

適應症
循環血流量的減少所引起之尿及腎機能不全、一般水份不足症、開刀前後之水份補給、小兒下痢症、高熱消耗性疾患、火傷、骨折時、酸中毒。

用法用量

每次 500~1000ml 點滴靜脈注射(視症狀增減)。

滴注速度為每小時 300~500ml (1 分鐘 80~130 滴)。

本藥限由醫師使用。

注意事項

- (一) 禁忌：乳酸血症患者。
2. 慎重投與：a. 腎疾患、腎功能不全患者；b. 心臟功能不全患者；c. 重症肝障礙患者；d. 高張性脫水症患者；e. 閉塞性尿道疾患以致尿量減少之患者。
3. 副作用：大量急速投與，有腦浮腫、肺水腫、末梢浮腫等現象。
4. 高齡患者之投與：一般高齡患者之生理機能低下，應注意減量。
5. 適用上之注意事項：a. 本藥含 Calcium，與檸檬酸鹽加血液混合會引起凝血，應注意；b. 與磷酸離子及碳酸離子會產生沈澱，不得與含磷酸或碳酸之製劑配合使用。
6. 使用上之注意事項：使用後之殘留藥液絕不可再用。
- (二) 取用時：
 1. 運輸過程中，容器可能因受重擊、震動而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動；若發現有上述情形時，請勿使用。
 2. 若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。
- (三) 輸液套選用及插入法：
 1. 請依輸液套使用方法正確使用。
 2. 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞；插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。
 3. 使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

貯藏方法

室溫貯存。

包裝

250、500、1000ml 玻璃瓶、塑膠瓶及軟袋裝。



台裕化學製藥廠股份有限公司
新竹縣竹東鎮員山路11巷13弄1號