

號

利保維源注射劑

Lyo-Povigent Injection

網號：R35

維他命是人類體內不可缺少之物質，通常經口攝取，但對於慢性消耗性疾病及長期經口攝取不足的場合，維他命的需求量則須從外部補充。本劑共含人體必須的 13 種維他命，依其溶解性質，區分為兩部份，Vial(PART I)含 9 種水溶性維他命，為凍結乾燥製劑，Amp.(PART II)含 4 種脂溶性維他命，為水性注射液，使用時將 Amp.(PART II)注入 Vial(PART I)溶解混合均勻即可。

成分：

Each Vial contains：(PART I)

Thiamine Hydrochloride	3.9mg
Riboflavin-5'-phosphate Sodium	4.6mg
Pyridoxine Hydrochloride	4.9mg
Cyanocobalamin	0.005mg
Niacinamide	40mg
Folic acid	0.4mg
Ascorbic acid	100mg
D-Panthenol	14mg
Biotin	0.06mg

Each Amp. contains：(PART II)

Vitamin A palmitate	3300IU
Cholecalciferol	0.005mg(200IU)
dl- α -Tocopheryl Acetate	10mg
Phytonadione	2mg

適應症：不能或不能充分經口、經腸道補給營養而需依賴靜脈營養時之維他命補給。

用法、用量：本藥限由醫師使用。

將 PART II 加入 PART I 中混合溶解後，加入高熱量靜脈營養輸液中，以中央靜脈點滴輸注之。成人通常一天一劑，可依年齡，症狀加以適當增減。

注意事項：

1. 本劑是添加於高熱量靜脈營養輸液中使用，若患者可以經口、經腸營養補充時，應儘快改用經口投與方式。
2. 本劑避免單獨投與，及末梢靜脈內投與。
3. 曾經對本劑或本劑配合成分發生過敏者及血友病患者(因本劑含有 Panthenol)，均避免使用。
4. 下列患者，應慎重投與：
 - (1) 因本劑含有 Vitamin D₃ 故對於高鈣血症之患者，若血液、尿液檢查，有發現異常現象

時，應停止使用。

- (2) 腎障害患者。
- (3) 本人或父母、兄弟姐妹有氣喘、發疹、蕁麻疹等過敏體質者。
- (4) 曾有藥物過敏反應患者。
5. 相互作用：因本劑含有 Pyridoxine HCl，故會降低 Parkinsonism 治療藥物 Levodopa 的有效性。
6. 副作用：
 - (1) 休克：雖極少有引起休克之現象，但亦必須細心觀察，若有血壓下降、悶胸及呼吸困難時，應立刻停止使用，並做適當之處理。
 - (2) 過敏症：偶有發疹、臉部潮紅之發生，若有此現象，應立即停止使用。
 - (3) 消化系統：偶有腹痛、下痢、食欲不振、噁心之發生。
 - (4) 肝臟：有時會引起 GOT、GPT 及 ALP 上昇之現象。
 - (5) 其他：偶而會引起高鈣血症。
7. 老年人投與：由於一般老年人的生理機能較差，故須注意酌以減量。
8. 孕婦投與：應避免 Vitamin D₃ 過剩，故須慎重投與。
9. 小孩兒投與：可能容易引起 Vitamin D₃ 過剩，故須慎重投與。
10. 對於臨床檢查值的影響：因為本劑含有 ascorbic acid，故會影響尿糖之檢出。
11. 使用上注意事項：
 - (1) 本劑避免單獨使用。
 - (2) 本劑 PART I, PART II 混合溶解後，應迅速加入高熱量輸液中稀釋後才能使用，通常應在 12 小時內使用完。
 - (3) 應注意所使用的配合輸注液對維他命之加速分解情形。
 - (4) 為防止維他命被光分解，因此在貯存，溶解使用時，均應避光。
 - (5) 本劑 PART II 是安瓿包裝，使用時應先用酒精棉擦拭切割之部份再與 PART I 混合溶解後，在無菌操作下加於輸注液內稀釋後供使用。

貯存：本藥品須冷藏(2~8℃)，避光貯存。

包裝：100 支以下小瓶裝及安瓿裝



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：

(02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號