

"南光"腦寶注射液

Noopol Injection "N.K."

衛署藥製字第 011420 號

「成分名」: Piracetam

「劑型、含量」: 注射劑: 每毫升含

Piracetam 200mg

「臨床藥理」:

本品主要係作用於中樞神經系統，它能選擇性作用於大腦皮質，增加大腦對低氧症之抵抗力，並能改善各種大腦損傷或腦血管障礙等症狀。(依文獻資料:藥物代謝:口服 40 分鐘後可達最高血中濃度，30 小時內由尿液排除，其中 1-2%由糞便排出。半衰期為 4-5 小時；完全腎衰竭及可逆性腎衰竭之患者半衰期為 48-50 小時。可通過胎盤障礙。)

「適應症」:

對腦血管障礙及老化所引起之智力障礙可能有效。

「用法用量」:

注射劑:本藥限由醫師使用。

平均劑量為:以 1gm 計一次 1 安瓿，每天三次。靜脈、肌肉注射均可。

在初期注射投藥時，每天可達到 10gm 或 15gm，依病情的輕重而酌量使用。

兒童:按體重，每天 30~50mg/公斤體重之間。

治療期間:除一些急性病例其效果幾乎即可顯見外，

通常自第三星期後可看出進步，爲了要使病情更好和增加其進步，必須依醫師指示繼續使用。

老人:根據其腎臟功能調整使用劑量。

兒童:依體重每天 30-50mg/公斤，分三次。

「注意事項」:

禁忌:嚴重腎臟機能不全者禁用。

「交互作用」:

與 warfarin 併用時可能會有出血(月經)之症狀出現。

「副作用」:

於治療初期可能會有精神運動性的精神激昂的症狀，但少見。其餘神經性症狀如頭痛、痙攣、暈眩、錐體外症狀及胃腸道症狀如噁心、嘔吐、厭食、下痢、便秘、及胃痛偶會發生。消化功能之改變亦曾發生。

「保存條件」:

注射劑---本藥應置於單劑量熔封容器內，並貯存於陰涼處，25°C 以下。

「包裝」:

5、10 公撮安瓿裝，100 支以下盒裝。



南光化學製藥股份有限公司
台灣 台南縣新化鎮中山路1001號
TEL:06-5984121(代表) FAX:
06-5972033