

●腦下垂體後葉子宮收縮成分Oxytocin製劑●

“大豐” **謳速生** 注射液

10國際單位/毫升(催產素)

OXOCIN INJECTION

10I.U./ml “T.F.” (Oxytocin)

【成分】

本劑為取自哺乳動物腦下垂體後葉之精製子宮收縮成分之水溶液。

每 ml 中含有：

Oxytocin.....10I.U.(1.66mg)

【作用與特徵】

Oxytocin 能藉增進子宮筋之收縮而具有促進分娩之作用。

【適應症】

分娩誘導、陣痛微弱、子宮內容除去術時之應用(胎狀奇胎摘爬)弛緩性子宮出血、分娩後或手術後之子宮出血、子宮收縮不全。

【用法用量】

1. 本劑係由醫師使用。

2. 通常一次 1 ~ 5 單位 (I.U) 注射於皮下或肌肉內。

3. 如行靜脈注射應使用點滴法或以一個單位為限徐徐注入之。

4. 對於應用本劑最多之分娩第二期之微弱陣痛，應先注射 1 ~ 5 單位於皮下筋內後，監視子宮收縮狀態及兒心音約 3 ~ 10，如用量不足則再注射 1 ~ 3 單位。胎兒娩出後則不妨一次注射 10 ~ 20 單位於皮下或肌肉內。

5. 但對於分娩初期子宮頸管之擴張不完全時或骨盤狹窄者切勿使用本劑。

【注意事項】

1. 本品用於醫療而非選擇性誘發分娩，僅能對親和胎兒最有裨益時使用。

2. 本品用於誘發或刺激分娩時，僅能以靜脈輸液給藥，並在醫院由受過訓練的人員投與，醫師應該能隨時處理併發症。

3. 正確投與本劑時，會刺激子宮產生與正常分娩相似的收縮；不正確投與本劑使子宮過度收縮時，對母親及胎兒都造成危險。即使正確投與，患者之子宮對本劑過敏者也會發生高張收縮。

4. 禁忌：早產、多產，顯著的胎頭與骨盆不平衡，既往子宮頸子宮手術(包括剖腹取兒術)，子宮過度擴張，侵入性子宮頸癌患者禁用本劑。

5. 副作用：

(1) 母親：過敏性反應，分娩後出血，心律不整，噁心、嘔吐。

(2) 胎兒：心跳徐緩，新生兒黃疸。

【包裝】1ml × 100Amp。

衛署藥製字第 033873 號



GMP 藥廠
大豐製藥股份有限公司
公司、工廠：彰化市延平里岸頭巷 11 號