

使用說明書

本藥限由醫師使用

請詳閱以下之說明書，因為說明書內詳細介紹了使用該產品應該注意的重要事項。如果您還有任何問題或不清楚之處，請向您的主治醫師或藥師請教。

諾貝爾注射液 PanNobel Injection

活性成分：抗壞血酸
可藉IV、IM 或 SC等方式投與

外觀：本品為無色或微黃色澄明溶液。

成分：每毫升含有250毫克抗壞血酸。

賦形劑：Sodium Hydroxide、Sodium Bicarbonate、Monothioglycerol、Sodium sulfite、EDTA disodium salt、Sodium Chloride、Water for Injection。

適應症：壞血症、齒齦出血、維生素C缺乏症。

用法用量：

	預 防	治 療
未成熟兒		75~100 mg/day
嬰兒	30 mg/day	100~300 mg/day
孩童、成人	70~150 mg/day	300~1000 mg/day

視臨床症狀之情況，必要時可用到上列劑量之3~5倍。

對於燒傷症狀之劑量為1~2 g/日。

成人每日最大治療劑量可用到6 g。

所需劑量可一次或分次投與。

副作用：至今為止沒有發現任何副作用。

過量使用：至今為止沒有發現任何因使用過量而引發的任何症狀。

包裝：2、5、10、20毫升安瓿裝，100支以下盒裝。

儲存：請存放於25°C以下，避光。

衛署藥製字第040074號

技術合作：

P_{AN}V_{IT}A_{GmbH}, Drosselweg 4/1, D-71679 Asperg, Germany

製造廠：



南光化學製藥股份有限公司

台灣·台南市新化區中山路1001號、1001-1號

TEL:(06)5984121(代表) FAX:(06)5981845