仿單標籤粘貼表

產品名稱	"壽元"修克托懸濁注射液 40 毫克	申請廠商	壽元化學工業股份有限公司
衛生福利部給證號碼	衛署藥製字 字 第 016963 號		

106. 10. 26

衛生福利部食品藥物管理署 騎縫章

衛署藥製字第016963號

副腎皮質荷爾蒙劑

"壽元" 修克托懸濁 注射液40毫克(安西諾隆)

Sivkort Sterile Suspension 40mg "S.Y." (Triamcinolone)

【成　分】：每mL含：
Triamcinolone Acetonide··40mg
賦形劑：Sodium Carboxymethylcellulose, Polysorbate 80, Benzyl Alcohol, Sodium Hydroxide, Hydrochloric Acid, Water for Injection.

【作　用】

本劑屬glucocorticoids，對糖質代謝作用，抗炎症，抗過敏性作用強，又對礦質代謝作用非常微弱，故長期使用不易引起鈉、水分貯留現象。無浮腫等副作用，通常一日肌肉注射40～80mg時持續效果平均10～30日有效。

【適 應 症】

過敏性疾患、皮膚疾患、膠原病、結合織炎及關節炎。

【用法用量】

肌肉注射用：一次20-80mg，依症狀適宜增減之。本劑限由醫師使用。

【警語及注意事項】

感染性、結核性關節炎原則上禁止使用。

(1)避免濫用，少量使用為宜，或行漸療法。

藥商地址請依所轄衛生局核定內容刊載

(2)如有感染症時，需同時併用抗生素或磺胺劑。
(3)發現有副作用（滿月樣顏貌、失眠、多毛、粉刺、骨多孔症等）時，應停藥。骨多孔症者，併用蛋白同化荷爾蒙劑。
(4)伴有高血壓者，應使用鹽類作用較少之藥(Methyl-prednisolone, Triamcinolone, Dexamethasone, Paramethasone, Betamethasone)。
(5)伴有糖尿病者，應使用劑量較低之藥(Dexamethasone, Betamethasone)。
(6)伴有消化性潰瘍者或有其既往歷者，原則上勿用為宜，或與制酸劑、胃粘膜保護劑併用。
(7)禁忌：下列疾患禁用本類藥：精神病、重疾精神神經症、活動性消化性潰瘍、抗生素無效之感染症。
(8)曾有文獻報導於硬脊膜外注射（epidural administration）給予皮質類固醇後發生罕見但嚴重的神經系統不良反應，包括視力喪失、中風、癱瘓、死亡等，多數個案發生於懸浮或緩釋劑型之皮質類固醇類注射劑成分藥品。
(9)本產品含有防腐劑成分，不應以椎管內（intracanal）或硬脊膜外（epidural）注射給藥。

【包　　裝】
1、2毫升玻璃安瓿裝，100支以下盒裝。
1、2、5、10毫升玻璃小瓶裝，100支以下盒裝。

壽元化學工業股份有限公司
嘉義市新民路128號

藥商地址請依所轄衛生局核定內容刊載

註

（1）報核仿單標籤以粘貼全形實物為原則。

（2）仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於粘貼時附送現品並將照相影本代替粘貼報核。

衛生福利部食品藥物管理署 騎縫章



副腎皮質荷爾蒙劑

"壽元"

1mLx100Amp.

衛署藥製字第016963號

修克托 懸濁注射液 40 毫克 (安西諾隆)

Sivkort Sterile Suspension 40mg "S.Y." (Triamcinolone)

成　　分: 每mL含

Triamcinolone Acetonide........40mg

適 應 症: 過敏性疾患、皮膚疾患、膠原病、結合纖炎及關節炎。

用法用量 : 請詳閱說明書後使用。

注　　意 : 請詳閱說明書後使用。本藥限由醫師使用。

LOT

EXP

4710961056683

壽元化學工業股份有限公司　嘉義市新民路128號

副腎皮質荷爾蒙劑 1mLx100Amp.

"壽元"

修克托

懸濁注射液40毫克(安西諾隆)

壽元化學工業股份有限公司

嘉義市新民路128號

108. 1. 31



"壽元"

修克托 懸濁注射液40毫克(安西諾隆)

Sivkort Sterile Suspension 40mg "S.Y."

(Triamcinolone)

衛署藥製字第016963號

用法·用量

請詳閱說明書後使用

(本藥限由醫師使用)

成分：每mL含

Triamcinolone Acetonide

...........40mg

4710961057840

LOT

EXP

壽元化學工業股份有限公司　嘉義市新民路128號