

生藥性血液循環改善劑

“南光” 循必利[®] 注射液 0.84 毫克/毫升

Trentine[®] Injection 0.84 mg/mL “N.K.”

銀杏葉抽出物的療效，主要是藉所含的兩類成分而產生：

一、Ginkgo flavonoid glycosides

◆有毒過氧游離基的祛除作用(free radical scavenging)

這是一種強而有力的過氧游離基祛除酵素(super oxide dismutase)，能有效去除體內過多的有毒過氧游離基，治療由過氧游離基所引起的一些症狀，諸如：血栓、動脈硬化、肝障礙、溶血、肺氣腫……等等疾病。

二、Ginkgolides

◆血小板活化因子的拮抗作用(platelet activating factor antagonism)

因其結構式與PAF者類似，可競爭性拮抗PAF的受體，進而抑制由PAF所引起的一些病理現象，諸如：血小板活化與凝集、血管壁通透性增加、支氣管收縮、發炎反應、過敏反應……等等。

所以，銀杏葉製劑主要用於血管方面的疾病，諸如：末梢循環障礙、老年癡呆、器質性腦部神經症狀、腦部急性病變、視網膜病變、斑狀衰退性失明、經期水腫、陽萎……等等。

□成分：Each mL contains:

Ginkgo Biloba Extract…………… 3.5 mg
(eq. to 0.84 mg Ginkgo flavonglycosides calculated as
Quercetin, Kaempferol and Isorhamnetin)

□賦形劑： Propylene glycol、sodium bisulfite、EDTA disodium salt、
sodium hydroxide、hydrochloric acid、water for injection。

□適應症：末梢血管循環障礙。

□用法用量：

注射液—本藥限由醫師使用。

注射---一日一次或二日一次，每次2~5毫升深部肌肉注射或慢慢靜脈注射。

點滴---依血管病變之嚴重程度，每日投與25~50毫升。物理上可配合的稀釋劑有：生理食鹽水、低分子Dextrane、HAES，二者配合的比例是銀杏：稀釋劑=1：10，再以每500毫升輸注2~3小時的速率投與。

□注意事項：

本品不得與其他藥品混合使用，尤其是自小牛血液中提煉出的萃取物。適合的稀釋劑有：生理食鹽水、低分子Dextran、HAES。本品適用於糖尿病患者。

□禁忌症：

缺乏fructose-1,6-diphosphatase的症狀。

□副作用：

胃腸疼痛(非常少見)、血液循環失調，像血壓降低、頭暈、頭痛(特別是因過敏所引起)、注射部位過敏、皮膚過敏。

□儲 藏：請於25℃以下，陰涼處儲存。

□包 裝：

2、5、10毫升安瓿裝，100支以下盒裝；10、20、25毫升小瓶裝，100支以下盒裝。

衛署藥製字第 036347 號

G.M.P.:G—3534



南光化學製藥股份有限公司

台灣·台南市新化區中山路1001號、1001-1號

TEL:886-6-5984121(代表) FAX:886-6-5981845

101515-00
26200000000322