

“瑞士”



胃潰定 注射液10毫克/毫升(發模梯定)

Ulcertain Injection 10mg/ml “Swiss” (Famotidine)

胃潰定內含Famotidine為一種組織胺 H_2 接受體拮抗劑， H_2 拮抗劑主要的作用機轉是阻止組織胺進入胃壁細胞，而達到阻止胃酸分泌的目的，現今廣泛使用 H_2 拮抗劑來解除消化性潰瘍，胃食道逆流疾病的症狀，經臨床研究證明Famotidine的效力較Cimetidine強，並較其它舊有的 H_2 拮抗劑具有更長的作用時間，且具較小之毒性與副作用。

【成分】

Each ml contains:

Famotidine.....10 mg

- 1.Famotidine是一種組織胺 H_2 接受體之競爭性抑制劑，其臨床上首要之藥理活性為抑制胃酸分泌，包括降低胃酸之濃度分泌量，及胃泌素之分泌量。
- 2.臨床實驗證實，Famotidine可抑制正常受試者及高胃酸分泌受試者之基礎分泌，夜間分泌之及食物，pentagastrin刺激分泌作用。
- 3.Famotidine可促進粘膜完整性，增加抵抗力，0.1-0.2 mg/kg之靜脈投與對正常人之胃粘膜血流量有增加的傾向，對十二指腸潰瘍之患者之胃液中粘液物質濃度無影響，對健康正常人之肝血流量，門靜脈血流量無影響。
- 4.Famotidine不具有中樞神經、心血管、呼吸或內分泌系統作用，對血中pro-lactin，性刺激荷爾蒙，性荷爾蒙值無影響。

【賦形劑】

L-Aspartic Acid、Mannitol、Water For Injection

【適應症】

住院病人伴隨有病理性胃酸分泌過高之症狀，頑固性（難治的）十二指腸潰瘍，或不能口服之病人消化性潰瘍之短期替代療法。

【用法用量】

本藥限由醫師使用。

一般建議用量為20 mg每12小時，以兩分鐘以上之注射速度給予靜脈注射，或將之加入輸液中，以15-30分鐘以上之時間給予靜脈注入。

【注意事項】

1.一般注意事項：

治療時，應充分觀察其經過，依病狀限用於治療上最小劑量，若本劑未見效果時，請改用其他療法。

2.下列患者，請慎重投與：

- (1)有藥物過敏症之既往歷病人。
- (2)有腎功不全者之患者。
- (3)有肝功能障礙之患者。

3.副作用：

- (1)過敏性：偶有發疹、皮疹、麻疹（紅斑）。當有這些症狀時，請中止投與。
- (2)血液：偶有白血球減少。
- (3)消化系統：偶有便秘、下痢、軟便、口渴、噁心、嘔吐等。
又極罕有腹部膨滿感、食慾不振等症狀。
- (4)循環系統：鮮有脈搏數增加、血壓上昇、顏面紅潮、耳鳴等。
- (5)肝臟：偶有S-GOT，S-GPT之上昇等肝機能異常。
- (6)精神神經系統：偶有全身倦怠、無力感。極罕有頭重感、頭痛。

4.孕婦、授乳婦之投與：

對於懷孕中投與之安全性尚未確定，故孕婦及可能已懷孕之婦女，最好不要投與，famotidine會分泌於母乳中，故投與famotidine注射液之授乳婦應停止授乳。

5.對小兒之投與：

對於小兒投與之安全性尚未確定。

6.其它：

Famotidine注射液之投與會隱蔽胃癌所引起的症狀，故投與前請先確認非惡性者。

【儲存條件】

請儲存於冷藏2-8℃。

【包裝】

2、5毫升安瓿裝，100支以下盒裝。

瑞士藥廠股份有限公司

SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.

新市廠：台南市新市區中山路182號