

“台裕” **維他命 C** 注射液 100 毫克/毫升

Vitamin C Injection 100mg/ml “Tai Yu”

【成分】

Each ml contains:

Ascorbic acid 100mg

【適應症】

壞血病、齒齦出血、維他命 C 缺乏症。

【用法用量】

1. 一日 50mg~1000mg，一至數回分割使用之。
2. 靜脈或肌肉注射之。
3. 本藥限由醫師使用。

【注意事項】

(一) 臨床檢查值之影響—各種糖尿之檢查顯示 Vitamin C 有妨害糖尿病檢出之傾向。

(二) 注射適用上之注意事項：

- (A). 經口服困難之場合或緊急需要之場合或經口服其效果不彰的場合均使用注射法，投與本劑時，原則上以靜脈注射為主。
- (B). 皮下肌肉注射時當儘量避免傷及組織及神經，更應注意下列諸點：
 - (1). 皮下肌肉注射最好少行，且同一部位避免反覆注射，尤其是對新生兒、未熟兒、及乳兒等之注射，更應謹慎注意。
 - (2). 神經密集處或神經走行部位，注射時，更應小心翼翼。
 - (3). 注射針刺入時有激痛感或拔針後有血液逆流而出者，均應變換部位後，再行注射之。
- (C). 靜脈注射時，若感覺得血管疼痛，則宜緩慢注射。
- (D). 皮下或肌肉注射，其注射之部位常有疼痛之現象。
- (E). 切割安瓶時，應注意勿使玻璃碎片混入藥內，並於切割時將安瓶用酒精棉擦抹後，再行切割。

【賦形劑】

Sodium Bicarbonate、Edetate Disodium、Benzyl Alcohol、Rongalite、Sodium Hydroxide、Water for Injection。

【貯藏方法】

遮光室溫保藏。

【包裝】

1、5ml 安瓿瓶裝，100 支以下盒裝。



台裕化學製藥股份有限公司
TAI YU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新竹縣竹東鎮員山路 11 巷 13 弄 1 號
TEL：(03)5826655 FAX：(03)5822389