

"羅得"安不嗽錠 30公絲 (安布索)

AMBROXOL TABLETS 30MG "R.T."

衛署藥製字 第 033204 號

須由醫師處方使用

版本日期 2025-11-21

1 性狀

1.1 有效成分及含量

每錠中含(Each Tablet Contains)：

Ambroxol Hydrochloride.....30 mg

1.2 賦形劑

Lactose、Potato Starch、Povidone、Microcrystalline Cellulose、Sodium Starch Glycolate、Citric Acid、Magnesium Stearate.

1.3 劑型

錠劑。

1.4 藥品外觀

本品為一圓形白色錠劑，一面有RT 917字樣。

2 適應症

祛痰。

3 用法及用量

3.1 用法用量

成人與6歲以上小孩:初期治療每天3次，每次30mg，長期治療每天2次，每次30mg。
2~5歲兒童，每日劑量1.2~1.6mg/kg，分3次服用。2歲以下兒童，每日劑量
1.2~1.6mg/kg，分2次服用。

4 禁忌

目前尚無資訊。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

有極少數的報告指出，發生如：多形性紅斑 (erythema multiforme)、史蒂文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症 (Stevens-Johnson syndrome <SJS> / toxic epidermal necrolysis <TEN>)、急性廣泛性發疹性膿皰症 (acute generalised exanthematous pustulosis <AGEP>) 等嚴重皮膚損害，與使用祛痰劑，如含ambroxol或bromhexine成分藥品有時間關聯性，但這些案例通常與患者

的潛在疾病及/或併用藥物有關。此外，在該等嚴重皮膚不良反應的早期階段，患者可能先出現類似流感的非專一性前兆症狀（如：發燒、身體感覺疼痛、鼻炎、咳嗽及喉嚨痛）。若受這些類似流感之非專一性前兆症狀的誤導，一開始可能會使用咳嗽及感冒藥來作症狀治療。因此，如果皮膚或黏膜出現新的傷口，須立刻尋求醫療諮詢並停藥。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

懷孕期之安全性尚未確立，孕婦投與前須先衡量其利弊得失。

7 交互作用

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

(1) 胃腸道：偶有胃部不快、胃痛、腹部脹滿感、下痢、噁心、嘔吐、便秘、食慾不振等現象。

(2) 過敏症：偶有發疹、蕁麻疹樣紅斑、搔癢感等症狀出現，停藥即可。

(3) 免疫系統疾患：

罕見：過敏反應 (hypersensitivity reactions)。

頻率未知：過敏性反應 (anaphylactic reactions) (包括：過敏性休克、血管性水腫、瘙癢症)。

(4) 皮膚及皮下組織疾患：

罕見：皮疹、蕁麻疹。

頻率未知：嚴重皮膚不良反應(包括：多形性紅斑、史蒂文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症、急性廣泛性發疹性膿皰症)。

8.1 臨床重要副作用/不良反應

目前尚無資訊。

8.2 臨床試驗經驗

目前尚無資訊。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

本品具有肺表面活性質分泌促進作用，氣管液分泌促進作用，線毛運動亢進作用，因此可以有效地幫助肺及支氣管粘液的排除與呼吸之通暢，本品耐受性良好，可以長期使用。

10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

4-1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

避光、室溫保存。

製造廠

羅得化學製藥股份有限公司

台中市大甲區東西七路一段65號

藥商

羅得化學製藥股份有限公司

台中市大甲區東西七路一段65號