

# “紐約”次碳酸鉍錠 0.324 克

BISMUTH SUBCARBONATE TABLETS “N.Y.”

內衛藥製字第 006263 號

腹瀉的原因甚多，舉凡胃腸感染，吸收障礙、藥物中毒、胰臟、肝臟疾病、特異體質以及神經腹瀉等。

成 分：每錠含

Bismuth Subcarbonate.....0.324Gm

作用機轉：

次碳酸鉍為一白色鹼式鹽，殆不溶於水，內服後於腸粘膜潰瘍面能形成一層薄膜，具機械性之保護作用，於胃潰瘍因呈弱鹼性有中和胃酸與對抗刺激作用，故臨床上常用做收斂劑、制酸劑、護底劑和吸著劑。

適應症：

腹瀉。

注意事項：

1. 應嚴守用法用量。
2. 不得連續服用壹週以上。
3. 服藥期間不可喝酒。
4. 如遇有下列情形應即請教醫師：
  - (1) 經數次服藥後病況未見好轉。
  - (2) 發高燒之瀉痢。
  - (3) 孕婦或有懷孕徵候之婦人。
  - (4) 使用於兒童時。

用法用量：

每人一天可服 3~4 次，成人每次 2~3 粒，兒童酌減劑量。

本藥須由醫師處方使用。

包裝：

1000 粒以下瓶裝。

GMP



人人化學製藥股份有限公司  
中壢市南園二路三號