伏順 膜衣錠 200 公絲
Foxate F.C.Tablets 200 mg

[說明]

本品可以對泌尿生殖道上的平滑肌發揮一種顯著的鎮痙功能。能對多種泌尿科的和婦科的疾病治療，特別是對抗復發的病例。
因排尿困難、急迫、夜尿及恥骨上的疼痛，或因膀胱及前列腺的疾病而引起的經常性的疼痛。例如：膀胱炎、膀胱痛、前列腺炎、尿道炎、尿道膀胱炎、尿道三角炎。
因腎及尿道的結石所做的尿道內鏡檢查，膀胱鏡導管插入式的手術，本品可做爲一種抗痙攣治療的佐藥。治療下尿道手術的後遺症。
治療女性生殖道的痙攣，例如：骨盆疼痛、月經疼痛、子宮高壓及動時感痛。

[成分] 每錠中含有

Flavoxate Hydrochloride 200 mg

[適應症]

神經性頻尿、慢性前列腺炎、慢性膀胱炎之頻尿、殘尿感。

[用法・用量]

一般劑量爲每次一錠，每天三～四次。
本藥須由醫師處方使用。

[禁忌]

有下列病例者勿使用本藥：

(1) 對本品敏感者。
(2) 有幽門及十二指腸的阻塞、腸阻塞等疾病之患者。
(3) 有胃腸出血者。
(4) 下尿道泌尿器阻塞疾病之患者。

[警告]

1. 帶有泌尿生殖道的併發感染的病患，本品應該和抗感染的治療，以適當之需要量配藥。
2. 青光眼，尤其是帶有 Closed-angle 的病患，應小心地服用本劑。
3. 操作機械及從事於須全神貫注的工作時，須特別注意，本藥可能引起的昏睡及視力模糊。

[孕婦的使用]

動物試驗顯示，本品對孕婦及胎兒無害。然而，在懷孕期間，假如要和其他藥品一起服用必須要小心，尤其在懷孕的前三個月。

[兒童]

由於 12 歲以下兒童的安全性及效能尚未被證實，因此 12 歲以下的兒童，不應該服用此藥。

[副作用]

服用本品偶而會有噁心及嘔吐的現象（飽胃之後，此現象消失）；會有昏昏欲睡的感覺（減低用量或減少服藥的次數，現象消失）；會有口乾、視力模糊、眼睛張力增加、心跳加速或心悸等現象。高劑量會造成便秘。

[貯存條件]

請置於緊密、避光的容器中，貯存於30℃以下。

[包裝]

6 ~ 1000 錠，塑膠瓶、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 G-7582
044572 號

SYNMOSA
健喬信元醫藥生技股份有限公司
303 新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號

SLT0870A