

成份	(每g含有)Brompheniramine Maleate.....4mg Pseudoephedrine HCl.....15mg
適應症	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)
用法用量	成人及12歲以上每次1g，1日4次，每次間隔4小時以上服用。6歲以上未滿12歲，每次0.5g；3歲以上未滿6歲，每次0.25g；3歲以下之嬰幼兒請洽醫師診治不宜自行使用。
臨床所見	鼻、鼻咽、副鼻窦和喉等諸部位，對吸入之空氣具有加溫、濕潤和初步淨化(將吸入之顆粒觸及粘膜)等之正常機能，在此過程中，此通道將暴露於多種刺激物和感染物。其黏膜含有許多粘液腺和淋巴組織；鼻粘膜血管床之運動有賴於交感神經與副交感神經間之協調，其對局部或全身性之刺激均能相當迅速且顯著的改變，以致於常被認為是一種勃起組織。由於刺激或感染引起之血管充血，粘液過度分泌，以及增殖腺和淋巴竇之增殖等能使通於竇、結膜與中耳之通道產生急性或慢性阻塞，而促發或加劇此諸部位之細菌感染，以致吸氣和言語受干擾引起令人困惱和難忍的痛苦，再加上此處經常罹患病毒和過敏性疾患，使其成為最重要之一過敏性病患。

藥理作用(1)Brompheniramine Maleate
屬於抗組織胺製劑，其抗組織胺的作用為在接受器與組織胺發生競爭性干擾之結果；亦可能為在主細胞損傷之後組織胺釋出的抑制，且其具有微弱的類副交感神經抑制作用，可為支氣管之解充血劑，而減輕鼻溢之情況。某些病人患有慢性之過敏性鼻炎、鼻竇、或是併發於急性感冒，本劑可直接地以Antihistamine作用緩解過敏現象，且可間接地增加粘膜對感染之抵抗力，而致被應用為感冒症狀之治療，又據多數臨床報告顯示，幾乎無一般抗組織胺製劑之嗜睡副作用的產生。

(2)Pseudoephedrine HCl
類交感神經興奮劑，使鼻粘膜及支氣管粘膜之血管收縮，減少充血及水腫區域之血流，排除其通路之阻塞物，並可增加其之通氣量，且其對表面血管與深層勃起組織一致，而堪稱理想的藥品。又其可使支氣管平滑肌弛放，而緩解氣喘之情況，並可減輕由於痙攣引起之呼吸窘迫感，且 Pseudoephedrine HCl之藥效與Ephedrine HCl相仿，但其對血壓升高及心臟、瞳孔、中樞神經之刺激作用均很弱，又其很快地從胃腸道吸收，迅速產生藥效，持續時間亦長，根據報告顯示，早期小劑量給予之治療效果，較晚期大劑量給予為佳。