

本藥須由醫師處方使用

吉多利錠

Ketosteril Tablets

衛署藥輸字第 018273 號

【成份】 每一錠含

Calcium-3-methyl-2-oxo-valerate (α-Ketoanalogue to isoleucine, Calcium salt)	67mg
Calcium-4-methyl-2-oxo-valerate (α-Ketoanalogue to Leucine, Calcium salt)	101mg
Calcium-2-oxo-3-phenylpropionate (α-Ketoanalogue to Phenylalanine, Calcium salt)	68mg
Calcium-3-methyl-2-oxo-butyrate (α-Ketoanalogue to Valine, Calcium salt)	86mg
Calcium-DL-2-hydroxy-4-(methyl-thio)-butyrate (α-Hydroxyanalogue to Methionine, Calcium salt)	59mg
L-Lysine-acetate (=75 mg L-Lysine)	105mg
L-Threonine	53mg
L-Tryptophan	23mg
L-Histidine	38mg
L-Tyrosine	30mg
Total nitrogen content/tablet	36mg
Calcium/tablet	1.25mmol=0.05g

【適應症】

慢性腎不全時胺基酸之補給。

【禁忌症】

高血鈣症、胺基酸代謝紊亂。到目前為止尚無應用於孕婦及幼兒之報告。

【副作用】

偶有高血鈣症。應定期檢查血清鈣含量。應確定給予病患足夠的卡路里。

【相互作用】

含鈣藥品 (例如：acetolyte) 可能引起血清鈣含量病理性的增加。由於 Ketosteril 使尿毒症狀減輕，若有服用氫氧化鋁應減量。注意血清碳酸鹽的減少。為了避免干擾吸收，勿同時投與易和鈣形成複合物的藥物 (例如：tetracycline)。

【用法用量】

口服。遵照醫師處方使用。或 70 公斤之成人，一次 4 到 8 錠，一天三次。餐中服用。

【使用時期】

腎絲球過濾率介於 5 ~ 15ml/min, 且食物攝取含蛋白質≤40g/day(成人)。

【包裝】

10 ~ 500 錠鋁箔片盒裝。

【注意事項】

超過有效期限請勿使用，請置於兒童不易取得處。

【製造廠名廠址】

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

(P) : Daimlerstraße 22, 61352 Bad Homburg v. d. H., Germany

(O) : 61346 Bad Homburg v. d. H., Germany



藥商：台灣費森尤斯卡比股份有限公司

地址：110 台北市基隆路二段 51 號 4 樓之 6

電話：(02)2739-1771