

“優良” 立 定 錠 300公絲 (碳酸鋰)
LIDIN TABLETS 300MG (LITHIUM CARBONATE)

“優良”立定錠 Lidin Tablets 的主成份碳酸鋰，是一種白色鹼性粉末，分子式 Li_2CO_3 ，功能改變體液內電解質的成份，產生鎮靜效果。本劑可抑制躁狂抑鬱症的發作。具有躁狂抑鬱症病史的患者，長期治療可防止發作或降低繼起發作的強度。

成 份：

Each tablet contains:
Lithium Carbonate.....300mg

適 應 症：躁病、預防躁鬱病。

用法用量：

急性治療：每次600mg，每日三次。

劑量可依臨床症狀及血中鋰濃度而調整，有效濃度約為1.0~1.5 mEq/l，患者應定期檢查血中鋰濃度。急性發作時，患者應每星期檢查兩次血中鋰濃度直至血中鋰濃度及臨床症狀穩定。

長期治療：劑量可依個人而不同，但血中鋰濃度應調致0.6~1.2 mEq/l。一般劑量為每次300mg，每日三次或四次。無併發症之患者至少每兩個月檢查一次血中鋰濃度。對鋰敏感的患者，在血中鋰濃度1.0~1.5 mEq/l 時即有中毒症狀發生，年老患者須減劑量。

本藥限由醫師使用。

副 作 用：

1. 血中鋰濃度在1.5 mEq/l 以下時，極少發生副作用。

血中鋰濃度1.5~2.0 mEq/l 時發生輕度至中度中毒反應，症狀包括腹瀉，嘔吐，倦睡及肌肉無力。

血中鋰濃度2.0~2.5 mEq/l 時發生中度至重度中毒反應，症狀包括眩暈，運動失調，視野模糊，耳鳴及多尿。

2. 急性治療時可能會發生手部輕微震顫，多尿症及輕微口渴現象。開始治療時，會有暫時及輕微的噁心及週身不適，繼續治療或暫時降低劑量均可使這些副作用消除。

注意事項：

1. 腎及心臟血管疾患，嚴重衰弱，脫水或鈉缺失，以及接受利尿劑的患者較易發生鋰中毒，故通常不適合使用本劑。若使用本劑，須極小心，採最低劑量，每日測血中鋰濃度，且住院治療。
2. 若有鋰中毒症狀出現時，須停藥且與醫師連絡。
3. 孕婦使用之安全性尚未確立，尤其是第一期孕婦避免使用本劑。
4. 人體對鋰的忍耐力在急性發作時較強，當症狀控制後則減緩。
5. 鋰主要由腎臟排泄，鋰會降低鈉自腎小管再吸收，造成鈉缺失，因此患者應維持正常飲食，包括鹽及水份(2500~3000ml)的攝食。過度流汗及腹瀉應額外補充電解質及水。
6. 過度流汗及腹瀉伴隨感染症及體溫升高者，須降低體溫及停藥。
7. 服用本劑時請勿飲酒。
8. 老年人患有嚴重之心臟病者如需服用本劑時，應請醫師特別指示。

包 裝： 100'S，500'S，1000'S粒瓶裝。

衛署藥製字第24474號

優良化學製藥股份有限公司
台灣省桃園縣中壢市東園路十七號