

鎂福

MAGVAC

內服液

Oral Solution

瑞安大藥廠股份有限公司

PURZER PHARMACEUTICAL CO., LTD.

G.M.P.優良藥品G-2316號

衛署藥製字第033998號

鎂福（MAGVAC）是含檸檬酸鎂（Magnesium Citrate）的內服液，而檸檬酸鎂是一種緩瀉劑。檸檬酸鎂主要作用在小腸，將小腸內的水份排入大腸，從而增加大腸之腸腔內壓及腸道的蠕動，因此可使腸道在3至6小時內排空。爲了達到排空的效果，適量水份的補充可增加排空的速度及效果。在此一過程當中，約15～30%的鎂鹽會被吸收。鎂及鉀離子主要是經由腎臟排出體外，故新生兒、高齡患者、或是腎功能不全者，會有滯留或積蓄的可能。

成 份	
每100ml中含：	
Magnesium Carbonate	4.29Gm
Citric Acid Anhydrous	7.83Gm
Potassium Bicarbonate	0.714Gm

適 應 症
緩瀉劑

用法及用量

(1)便秘疾患的急性治療
一次口服20～50ml即可，口服後並需充份補充水份，以達到排空的效果。一般建議睡前服用。

(2)大腸檢查（X-RAY,ENDOSCOPY）前胃腸道內容物之排空及腹部手術前胃腸道排空。
原則上，每次用量爲一瓶（250ml），口服後並需充份補充水份，以達到排空的效果，用於X-Ray檢查或腹部手術之排空時，建議使用法如下：

《X-Ray檢查或手術前一天》

1.6:00PM：晚餐僅食流汁即可，如清湯、果凍，再加上250ml的水份。
2.7:00PM：口服鎂福內服液一瓶（250ml）一次喝完及補充水份250ml。
3.7:30PM：再補充250ml水份之後，每隔半小時補充250ml水份到9:30PM，共4次。
4.10:00PM：以250ml白開水口服Bisacodyl 10mg。
5.自10:00PM以後至X-Ray檢查或手術前不得進食，白開水除外。

《第二天（X-Ray檢查或手術當天）》

1.6:00AM：自肛門塞入Bisacodyl 10mg栓劑一粒，必須強忍便意10～15分鐘方可。

副 作 用

過度的腸道蠕動會引起腹瀉或腹部不適，噁心、嘔吐、腹部絞痛、眩暈、衰弱感、心悸、出汗、及頭昏等現象。

禁 忌

有嚴重腎機能不全者不得使用本劑。

注意事項

1.若有腹痛、噁心、或嘔吐現象，請勿使用任何瀉藥，包括本劑。
2.口服本劑後，必須充份補充水份，以達到很好的排空效果。
3.若使用於胃腸道之排空，以利大腸檢查或腹部手術時，則於口服本劑後不得飲用或食用牛奶或牛奶類食品。
4.經常使用本劑可能會造成習慣依賴。
5.請將本劑放置在孩童無法取得的地方。
本劑須由醫師處方使用：

貯 藏：室溫貯存
包 裝：1000ml（公撮）以下瓶裝。

製造商：瑞安大藥廠股份有限公司
桃園縣觀音鄉觀音工業區大同一路26號