

“美 時”

GMP
衛署藥製字第 033664 號
G-2194

美舒鬱 (塩酸查諾頓)
錠 50公絲

Mesyrel®
Tablets 50mg “LOTUS”
(Trazodone Hydrochloride)



〔組 成〕：
每錠含 Trazodone hydrochloride 50mg

〔藥理作用〕：
Mesyrel 於人類的抗抑鬱作用的機構未完全被瞭解，在動物上，Mesyrel 選擇性的抑制 Brain synaptosomes 對於 serotonin 的吸收，同時對於 serotonin 的前趨物，5-hydroxytryptophan 所誘發的行為改變有加強作用，Mesyrel 對於麻醉後的狗的心臟傳導效應和三環抗抑鬱劑所引起的，有性質上的不同，同時於量上也較不顯著，Mesyrel 不是單胺氧化酵素抑制劑 (MAOI) 同時和安非他命類的藥物也不同，並不會刺激中樞神經系統。對於人類 Mesyrel 口服可良好吸收並不會選擇性的集中於任一組織。當 Mesyrel 於飯後服用，食物可能會增加藥量的吸收，減少最高血中濃度同時延長到達最高濃度的時間，當 Mesyrel 被空腹使用時，大約於一小時可達最高血中濃度，而於飯後服用則須兩小時，Mesyrel 的排洩是兩相的 (Biphasic) 包括初相 (半衰期 3 至 6 小時) 接著是較慢的第二相 (半衰期 5 至 9 小時)，同時並不受食物的影響，因為 Mesyrel 從身體的消除會有一些個體差異，於某些病人，Mesyrel 可能會儲積於血漿中，對於 Mesyrel 會有反應的病人，三分之一的住院病人和一半的門診病人於治療開始的第一週會有有意義的治療反應，四分之三的對於治療有反應的病人於治療的第二週內會有有意義的治療效果，四分之一對於治療有反應的病人需要二至四週以達到有意義的治療反應。

〔適應症〕：
治療各種型態之抑鬱症。

〔禁忌症〕：
嚴重肝功能障礙及對本品過敏之病人。

〔副作用〕：
Trazodone 最常見的副作用是鎮靜和疲勞、激動、口乾、頭昏和低血壓有時可能會發生。

〔藥物相互作用〕：
Trazodone 可能會加強酒精的作用，與 MAO 抑制劑有相互作用，不宜合併使用。

〔懷孕及哺乳婦女及小孩之使用〕：
由於缺乏經驗，本品不推薦使用在懷孕及哺乳中婦女。十八歲以下之小孩其使用之效果與安全性尚未確立。

〔用量與用法〕：
劑量應從低量開始，漸漸增加並注意臨床反應和任何無法耐受的反應，昏睡 (drowsiness) 發生時可能須要將每日劑量的大部份置於睡前服用或須要降低劑量，Mesyrel 應於飯後或點心後立即服用，於治療第一週內可看到症狀的減輕，於兩週內會有較佳的抗抑鬱效果，對於 Mesyrel 有反應的 25% 病人中須要兩週以上 (至四週) 的服藥才會有較佳的效果。

普通成人劑量：最初建議劑量是每天 150 毫克，每三至四天可增加五十毫克 (一日)，對於門診病人的最高劑量每天不得超過 400 毫克 (分開劑量)，住院病人 (即較嚴重的抑鬱病人) 可給至每天不得超過 600 毫克 (分開劑量)。

維持劑量：於較長的維持治療，劑量應保持於最低的有效水平，一旦足夠的反應已經達到，劑量可依治療反應漸漸降低，雖然沒有超過六週的有系統的有關 Mesyrel 的評估，關於抗抑鬱的治療期間一般建議應該繼續幾個月以上。

〔包裝〕：
12 ~ 1,000 錠瓶裝，鋁箔盒裝。



CGMP 藥廠
美時化學製藥股份有限公司
南投縣南投市南崗工業區成功一路 30 號

TEL: (02) 2778-5188

931115