

杏 定 痛 錠 (本補麻隆)100 公絲

NOGOUT Tablets 100mg (Benzbromarone) “SINPHAR”

----- 痛 風 治 療 劑 -----

(Uricosuric Agent)

Benzbromarone 可以降低血漿中尿酸濃度，可能與其阻斷腎小管再吸收作用有關，同時還可以增加尿液中尿酸的排泄，對整個身體尿酸的排出具療效。

成份：每錠含：

Benzbromarone.....100mg

適應症：痛風、高尿酸血症、高血壓所引起之高尿酸血症之改善。

用法用量：每日一錠，飯後或飯中吞服。

副 作 用：

1. 偶有胃腸道副作用，特別是腹瀉。
2. 在治療初期可能痛風急性發作，建議另外服用秋水仙素(Colchicine)和抗發炎藥物。
3. 曾有病患服用 benzbromarone 發生過敏性結膜炎。

注意事項：

1. 腎機能不全病患使用本藥須特別謹慎。
2. Acute porphyria 的病患勿使用本藥。
3. 建議病患多喝水，同時調節尿液酸鹼值於 6.3 6.7 間，以避免腎結石。
4. 懷孕、授乳期不得使用本藥。
5. 長期投與時，應做肝機能定期檢查。
6. 開始投與本藥品前應先進行肝功能檢查，以確認病人沒有肝功能異常。

交互作用：

1. Salicylate 可能減弱 benzbromarone 的藥效。
2. Ethacrynic acid 會使 benzbromarone 失效。
3. Dicumarol 會增加尿酸的排泄。

警語：

1. 猛爆性肝炎等嚴重不良反應主要會在開始投藥前六個月內發生，因此最少在最初給藥六個月內，應定期進行肝功能檢查。
2. 在使用期間如有肝臟不良反應之症狀如：食慾不振、全身倦怠發生時，應立即停止使用本藥品，並到醫療院所就醫檢查。

禁忌症：

肝功能異常者。

貯 藏：室溫下保存，避免日光直射及受潮，並置放於兒童不易取得之處。

包 裝：2~1000 粒鋁箔盒裝及塑膠瓶裝。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第 041807 號 G-6098 號

杏輝藥品工業股份有限公司

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村 84 號

84, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG – SHAN SHINE, 1-LAN, TAIWAN

服務專線：(0800)021053、015151 **web site:** [http: //www.sinphar.com](http://www.sinphar.com)

IT-1490-02