

"汎生" 僕樂彼 錠 50 公絲

Polupi Tablets 50mg "Panbiotic"

衛署藥製字第 043335 號

G-6885

【特點】

自從 Astwood 氏發現 Thiouracil 化合物有抑制甲狀腺機能亢進作用以來，藥物治療法極受注意，"汎生"POLUPI 錠乃 Thiouracil 化合物中效力最確實、副作用最少之抗甲狀腺劑。Propylthiouracil 對於甲狀腺機能亢進所引起之諸疾病具有卓效。臨床上應用於甲狀腺中毒症、伴發甲狀腺機能亢進之腺樣甲狀腺腫之治療皆能見效。應用於(1)因合併症以致無法實行外科手術之甲狀腺機能亢進之治療。(2)如即時實行外科手術恐有危險性之病例之手術前治療。

【藥理作用】

Propylthiouracil 能抑制甲狀腺荷爾蒙之產生過剩，降低基礎代謝率，抑制心肌之氧氣消耗，增進心臟機能效率。

【成份】

每錠含：Propylthiouracil 50 mg

【適應症】

甲狀腺機能亢進症

【用法、用量】

(1)初期量：一日 300 mg 分 3~4 次服用，對於重症一日 400~600 mg。服藥續至病狀消除後，1~4 週內藥量漸減，其維持劑量參照基礎代謝率而決定，一日 50~100 mg，分 1~2 次服用。

(2)小兒初期量：10~14 歲一日 200~300 mg，5~9 歲 100~200 mg 分 2~4 次服用。服藥續至病狀消除後，1~4 週內藥量漸減，維持劑量一日 50~100 mg，分 1~2 次服用。

(3)孕婦初期量：一日 150~300 mg，分 3~4 次服用。服藥續至病狀消除後，1~4 週內藥量漸減，維持劑量一日 50~100 mg，分 1~2 次服用，必要時以最低限量投與。

【注意事項】

1.禁忌：(a)對本劑過敏的患者(b)服用本劑後肝功能情況惡化者(本劑使用後肝機能惡化病例中，繼續使用會產生嚴重肝炎)2.慎重投與：a.有肝功能障礙的患者(因為肝功能障礙而更加惡化者，且有定期充分地觀察檢查肝功能，且檢查結果又符合臨床症狀的時候，停止用本劑並作肝功能檢查和觀察。本劑和肝功能的因果關係已確定，故此狀況應適當處理之。)b.有中度以上的白血球減少症和血液障礙的患者。3.相互作用：香豆素(Coumarin)系抗凝血劑 (影響抗凝血作用、併用該製劑時應注意)。4.副作用：a.重大的副作用：1.無顆粒性白血球症：偶爾無顆粒性白血球症(初期症狀、發熱、全身倦怠、咽頭痛等)，疑似無顆粒性白血球症發生時，停止使用本藥，並投與抗生素與副腎皮質質爾蒙等適當處置。2.再生不良性貧血、低蛋白血症、第 VII 因子缺乏症、血小板減少性紫斑病、白血球減少症。3.重症肝炎、黃疸：重症肝炎、黃疸等重症肝功能障礙出現時，應定期肝功能檢查，異常時應中止本藥並做適當處置。4.SLE 樣症狀：SLE 樣症狀(發熱、紅斑、筋肉痛、關節痛、淋巴結腫脹、脾腫)5.間質性肺炎：(發熱、咳嗽、呼吸困難、胸部 X 光異常伴隨間質性肺炎，停止使用本藥，並投與副腎皮質質爾蒙等適當處置。6.抗嗜中性白血球細胞質抗體(ANCA)關連血管炎症候群：投予中急性進行性腎炎症候群(初發症狀：血尿、蛋白尿等) 肺出血：初期症狀類似感冒。肘、膝蓋等的關節痛、紫斑，上強膜炎等的 ANCA 陽性血管炎症候群障礙。b.其他的副作用：1.肝臟：GOT、GPT 上升 2.皮膚：偶爾的毛髮脫落、皮膚色素暗沈、瘙癢感、紅斑。3.消化器官：偶爾會噁心、嘔吐、下痢、食慾不振 4.精神、神經方面：偶爾頭痛、末梢神經異常等現象 5.過敏症：尋麻疹、發熱 6.其他：倦怠感、淋巴結腫脹、關節痛、筋肉痛、唾液腺肥大、浮腫、味覺減退 5.高齡患者的投與：一般高齡的患者因生理機能衰退，用量應特別注意 6.懷孕的婦女和授乳的婦女的投與：(1)a.懷孕中的婦女應確立胎兒的安全性，有胎兒甲狀腺腺腫、

甲狀腺機能抑制報告。b.懷孕中的婦女或可能懷孕的婦女應定期施行甲狀腺機能檢查，且甲狀腺機能應維持適當，並調節其投與量。c.新生兒出生後，應充分地觀察是否會有甲狀腺機能抑制及甲狀腺機能亢進現象。(2)本藥可能經由母乳分泌，授乳中的婦女應避免大量投予。7.過量投與:甲狀腺腫、甲狀腺機能衰退。8.其他:a.投與中有自體免疫症後群報告b.國外有授乳中或懷孕中的婦女使用，新生兒肝障礙的報告。

置於陰涼處避光貯存。

本藥須由醫師處方使用。

[包裝] 6-1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。



臺灣汎生製藥廠股份有限公司

高雄縣鳥松鄉 埔村大同路 5-1 號